中华人民共和国农业农村部公报

ZHONGHUARENMINGONGHEGUONONGYENONGCUNBUGONGBAO

2024年第10期(总第253期)

目录

意见通知

农业农村部 国家发展改革委 工业和信息化部 财政部

中国人民银行 市场监管总局 金融监管总局关于促进

肉牛奶牛生产稳定发展的通知

4

农业农村部办公厅 财政部办公厅关于印发《2024—2026年

全国通用类农业机械中央财政资金最高补贴额一览表》

的通知

7

公告通报

中华人民共和国农业农村部公告 第819号

37

中华人民共和国农业农村部公告 第823号

39

中华人民共和国农业农村部公告 第825号

59

中华人民共和国
农业农村部
办公厅主办

主 编 丁 斌
常务副主编 苑体强

公 报 室
主 任 易 勇
副 主 任 吴 欣

责任编辑 周圆圆

本刊微信公众号

中华人民共和国农业农村部公告	第826号	60	
中华人民共和国农业农村部公告	第827号	60	
中华人民共和国农业农村部公告	第828号	72	
中华人民共和国农业农村部公告	第829号	76	
中华人民共和国农业农村部公告	第830号	80	
中华人民共和国农业农村部公告	第831号	80	
中华人民共和国农业农村部公告	第832号	89	
中华人民共和国农业农村部公告	第835号	102	
农业农村部办公厅关于2024年第三期兽药质量监督抽检情况的通报		122	
			编辑 农业农村部公报室 出版 北京市朝阳区 地址 农展馆南里11号 邮编 100125 电话 010-59192335 010-68259537 传真 010-65001869 电邮 nybgb@sina.com 刊号 <u>ISSN2096-7969</u> CN10-1641/D 印刷 鸿博昊天科技有限公司 出版日期 2024年10月20日

GAZETTE OF THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL AFFAIRS OF THE PEOPLE' S REPUBLIC OF CHINA

NO.10,2024 (VOL.253) CONTENTS

Decisions and Circulars

- Joint circular of the Ministry of Agriculture and Rural Affairs, the National Development and Reform Commission, the Ministry of Industry and Information Technology, the Ministry of Finance, the People' s Bank of China, the Administration of Markets Supervision, Inspection & Management and the National Financial Regulatory Administration on maintaining stable development of beef cattle and dairy cattle industries /4
- Joint circular of the General Offices of the Ministry of Agriculture and Rural Affairs and the Ministry of Finance on printing and distributing catalog of central government maximum subsidy on farm machinery under national general–use category for 2024–2026 /7

Announcements and Notifications

- Announcement No. 819 of the Ministry of Agriculture and Rural Affairs of the People's Republic of China /37
- Announcement No. 823 of the Ministry of Agriculture and Rural Affairs of the People's Republic of China /39
- Announcement No. 825 of the Ministry of Agriculture and Rural Affairs of the People's Republic of China /59
- Announcement No. 826 of the Ministry of Agriculture and Rural Affairs of the People's Republic of China /60
- Announcement No. 827 of the Ministry of Agriculture and Rural Affairs of the People's Republic of China /60
- Announcement No. 828 of the Ministry of Agriculture and Rural Affairs of the People's Republic of China /72
- Announcement No. 829 of the Ministry of Agriculture and Rural Affairs of the People's Republic of China /76
- Announcement No. 830 of the Ministry of Agriculture and Rural Affairs of the People's Republic of China /80
- Announcement No. 831 of the Ministry of Agriculture and Rural Affairs of the People's Republic of China /80
- Announcement No. 832 of the Ministry of Agriculture and Rural Affairs of the People's Republic of China /89
- Announcement No. 835 of the Ministry of Agriculture and Rural Affairs of the People's Republic of China /102
- Notification of the General Office of the Ministry of Agriculture and Rural Affairs on 3rd issue of veterinary drug quality supervision and random check results for 2024 /122

农业农村部 国家发展改革委
工业和信息化部 财政部 中国人民银行
市场监管总局 金融监管总局
关于促进肉牛奶牛生产稳定发展的通知

农牧发〔2024〕16号

各省、自治区、直辖市及计划单列市和新疆生产建设兵团农业农村（农牧）、畜牧兽医厅（局、委）、发展改革委、工业和信息化主管部门、财政厅（局）、市场监管局（厅、委）、金融监管局；中国人民银行上海总部，各省、自治区、直辖市及计划单列市分行：

2023年以来，全国牛肉牛奶价格持续走低，养殖场户普遍亏损，经营困难，肉牛奶牛生产面临多年未遇的严峻形势。为采取切实措施帮助养殖场户渡过难关，稳定肉牛奶牛生产，现将有关事项通知如下。

一、着力稳定肉牛奶牛基础产能

肉牛奶牛生产周期长，过度淘汰母牛将对产业持续健康发展造成严重影响。各地要把保护母牛基础产能放在突出位置，抓紧抓实抓好各项重点工作。加快实施基础母牛扩群提质项目，通过“先增后补、见犊补母”方式，对饲养肉牛基础母牛、选用优秀种公牛冻精配种的养殖场户给予积极支持，在稳住基础母牛群体数量的基础上，提升母牛种用性能和繁殖效率。培育奶牛家庭牧场和奶农合作社等新型经营主体，改进设施装备，促进良种良法配套，提升生产经营能力。奶业主产省份可结合本地区实际，探索实施喷粉补贴、增量收购补贴等紧急纾困政策，帮助养殖加工企业缓解生产经营压力，稳定养殖预期。

二、有效降低养殖场户饲草成本

饲草料是肉牛奶牛的“口粮”。当前正值集中收储青贮玉米的关键时节，各地要把降低收储成本作为促进养殖节本增效的关键举措，用好用足粮改饲支持政策。以青贮玉米、苜蓿、饲用燕麦等优质饲草为重点，兼顾区域性特色饲草品种，加快推进优质饲草收储进度。鼓励探索实施农作物秸秆与优质饲草混贮利用，对肉牛奶牛等草食家畜养殖场户、企业、农民合作社以及专业化饲草收储服务组织等主体给予支持。强化青贮收获机械等条件保障，加强青贮饲料收获制作技术指导，帮助养殖场户备足用好青贮饲料。加强肉牛奶牛饲草料供需情况调度，及时准确掌握饲草料储备情况，组织做好产销衔接，防止发生缺草断供问题。内蒙古、四川、西藏、甘肃、青海、宁夏、新疆等7个牧区省份和新疆生产建设兵团要组织实施好草原畜牧业转型升级整县推进项目，督促项目县按照批复的项目实施方案抓好落实，加强高产稳产优质饲草生产、优良种畜和饲草种子扩繁以及防灾减灾饲草贮运体系等基础设施建设；加强项目资金全链条监管和日常调度，严格按照有关制度支出和使用资金，提高项目建设质量。

三、推动奶业养殖加工一体化发展

各地要全面落实稳定可控奶源要求，强化部门协作联动，细化工作措施，抓紧构建产加销紧密协作的利益联结机制，稳定生鲜乳购销秩序，保障奶农合法权益。督促乳品加工企业规范复原乳添加和标识管理，促进鲜奶加工消费。优化实施奶业生产能力提升整县推进项目，提高养殖大县奶业综合生产能力，促进一二三产业融合发展。各地建设的以肉牛、奶业为主导产业的现代农业产业园、优势特色产业集群项目，要进一步强化对饲草料种收储、养殖、屠宰、加工全产业链发展的支持，结合本地实际对饲草料种收储和养殖环节给予更加精准有效支持，促进产业提档升级和农牧民增收。

四、强化信贷保险政策支持

各地要主动开展肉牛奶牛养殖场户对接走访工作，对养殖经验丰富、饲养管理水平较高、信用良好的养殖场户建立白名单制度，鼓励银行机构在有效防控风险前提下积极给予信贷支持。加强银政企户精准有效对接，对生产经营正常、信用状况良好、具备持续经营能力但暂时遇到困难的肉牛奶牛养殖场户等涉农主体，鼓励金融机构通过合理展期、续贷等方式予以支持，不盲目抽贷、断贷、限贷。支持将肉牛奶牛活体、养殖圈舍等纳入抵质押品范围，地方各级农业农村部门要会同金融部门积极推进养殖圈舍、大型养殖机械、活体畜禽等抵押登记、评价、流转、处置等机制建设。鼓励开展肉牛奶牛产业专属信贷服务，共享数据信息，强化信贷风险管理和处置。要着眼入秋以后收储青贮玉米的资金需求，鼓励银行机构创新“青贮贷”等专项金融产品。各地要积极用好基础母牛扩群提质、奶业新型经营主体培育等政策，可探索采取贴息补助的方式给予支持。全国农业信贷担保体系要加强对养殖场户的担保增信支持。保险机构要优化保险服务，做到精准投保、及时理赔、应赔尽赔。各地要落实好中央财政对地方优势特色农产品保险奖补政策，因地制宜支持发展肉牛养殖、基础母牛养殖保险。探索创新保险、信贷联动支持模式，利用保单数据构建信贷模型，撬动更多金融资源支持肉牛奶牛生产稳定发展。

五、强化脱贫地区和脱贫群众肉牛奶牛产业支持

肉牛奶牛产业已成为部分欠发达地区的支柱产业和部分脱贫群众的重要收入来源。各地要全面了解分析研判当前脱贫养殖户面临的困难，一户一策落实针对性帮扶措施，尽可能减少牛肉等农产品价格下行对脱贫养殖户带来的影响。按照相关规定统筹用好衔接资金，对符合支持条件的肉牛奶牛脱贫养殖户予以补助，推动调整优化养殖结构，减少养殖亏损。按照帮扶产业“四个一批”有关要求，结合实际、分类施策，谋划实施好脱贫地区肉牛奶牛帮扶产业项目，补齐产业短板，延长产业链条，提高抗风险能力。

六、促进牛肉牛奶消费

各地要综合用好新媒体和传统媒介，通过制作发布短视频、长图等方式，在官方网站、公众号等平台开设牛肉牛奶促消费宣传专栏，宣传展示鲜牛肉、鲜牛奶品质和营养价值，发布牛肉牛奶美食地图、展示本地特色饮食文化，促进牛肉牛奶消费。用好展会、中国农民丰收节金秋消费季等平台，促进牛肉牛奶产

销衔接。加强牛肉牛奶消费常识科普,纠正消费认知误区。推广“学生饮用奶”,鼓励有条件的地方通过发放消费券等方式,拉动牛奶消费。

七、加强技术指导服务

各地要建立健全肉牛奶牛生产监测和预警体系,摸清产能底数,强化生产形势分析研判和预警引导。充分发挥畜牧兽医技术支撑机构、行业协会、产业技术体系、科研院校等技术力量优势,组织推动技术下乡、服务上门。继续实施农技推广特聘计划,在牧区、半牧区和边境地区招募特聘动物防疫员,指导做好肉牛奶牛疫病防控。围绕优质饲草高效利用和农副产品资源饲料化利用、精细化饲养管理、肉牛奶牛选种选配、疫病防控等关键环节,通过培训讲座、现场指导、发放技术手册等多种形式,集成推广一批高效实用技术,指导养殖场户提高饲养管理水平和生物安全防护水平,实现节本提质增效。

各地要高度重视牛肉和牛奶稳产保供工作,切实加强组织领导,强化部门沟通协作,形成工作合力。鼓励各地在组织落实好现有资金渠道基础上,结合实际出台更有针对性的助农助企纾困支持政策。要建立与养殖场户(企业)常态化沟通交流机制,经常性听取意见建议,指导和帮助解决好生产经营中遇到的实际困难,及时发现并解决苗头性问题,促进肉牛奶牛生产平稳发展。

农业农村部 国家发展改革委 工业和信息化部
财政部 中国人民银行 市场监管总局
金融监管总局
2024年9月14日

农业农村部办公厅 财政部办公厅 关于印发《2024—2026年全国通用类农业机械 中央财政资金最高补贴额一览表》的通知

农办机〔2024〕6号

各省、自治区、直辖市及计划单列市农业农村（农牧）厅（局、委）、财政厅（局），新疆生产建设兵团农业农村局、财政局，北大荒农垦集团有限公司，广东省农垦总局：

根据《农业农村部办公厅、财政部办公厅关于印发〈2024—2026年农机购置与应用补贴实施意见〉的通知》（农办机〔2024〕3号）的要求，农业农村部、财政部组织制定了《2024—2026年全国通用类农业机械中央财政资金最高补贴额一览表》（见附件1，以下简称《一览表》），现予印发，并就有关事项通知如下。

各省（含省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团，北大荒农垦集团有限公司、广东省农垦总局）可从《一览表》中选择本省农业生产急需的、群众欢迎的档次进行补贴，原则上要采用《一览表》相关档次的基本配置和参数要求。在此基础上，各省可通过增加基本配置和参数要求的方式优化档次，但不得以其他方式对档次进行调整。确有必要的，各省需与农业农村部、财政部充分沟通并达成一致意见后，可在通用类机具品目中增设新的档次进行补贴。

各省可围绕粮油等主要作物大面积单产提升、机收减损、丘陵山区农业生产急需、农机装备补短板、农业其他领域发展急需，以及事关国家重大战略实施的农业机械的推广应用，选择不超过10个品目且不超过20个档次的产品提高补贴额（含新能源农机），涉及的通用类品目机具可高于中央财政资金最高补贴额，幅度控制在最高补贴额的20%以内。上述品目之外的其他通用类机具品目，其所属档次的补贴额不得高于《一览表》相应档次的最高补贴额。

各省要对区域内保有量明显过多、技术相对落后、不符合当地实际应用情况、群众反映问题较多、实际使用性能较差的机具建立清单，分别按照降低补贴标准、退坡或退出补贴范围等方式处理。

对《一览表》现有档次未涵盖的机具，均按非通用类机具管理。东北、黄淮海、长江中下游、西南、西北、华南地区农业生产类型相似或相同省份要坚持区域一体化原则，共同研究制定本区域非通用类农业机械最高补贴额建议一览表，防止区域内省份同类同档产品补贴额差距过大。

各省要按照《2024—2026年农机购置与应用补贴实施意见》规定和本通知要求，严格遵循专家测算、集体审议、公示、发布的程序，加快制定公布本省农机购置与应用补贴机具补贴额一览表（格式见附件2）。

附件：1. 2024—2026年全国通用类农业机械中央财政资金最高补贴额一览表

2. 农机购置与应用补贴机具补贴额一览表（格式）

农业农村部办公厅 财政部办公厅

2024年9月6日

附件1

2024—2026年全国通用类农业机械 中央财政资金最高补贴额一览表

大类	小类	品目	档次编号	档次名称	基本配置和参数	中央财政最高补贴额(元)	备注
一、耕整地机械	(一) 耕地机械	1. 旋耕机	1.1	单轴1~1.5m旋耕机	单轴; 1m≤工作幅宽<1.5m	390	
			1.2	单轴1.5~2m旋耕机	单轴; 1.5m≤工作幅宽<2m	930	
			1.3	单轴2~2.5m旋耕机	单轴; 2m≤工作幅宽<2.5m	1800	
			1.4	单轴2.5m及以上旋耕机	单轴; 工作幅宽≥2.5m	2300	
			1.5	双轴1~1.5m旋耕机	双轴; 1m≤工作幅宽<1.5m	600	包含双轴灭茬旋耕机
			1.6	双轴1.5~2m旋耕机	双轴; 1.5m≤工作幅宽<2m	1600	
			1.7	双轴2~2.5m旋耕机	双轴; 2m≤工作幅宽<2.5m	3100	
			1.8	双轴2.5m及以上旋耕机	双轴; 工作幅宽≥2.5m	3400	
			1.9	1.2~2m履带自走式旋耕机	型式: 履带自走式; 1.2m≤耕幅<2m; 22.1kW≤发动机功率≤88.2kW; 离地间隙≥280mm	5800	
			1.10	2m及以上履带自走式旋耕机	型式: 履带自走式; 耕幅≥2m; 51.4kW≤发动机功率≤88.2kW; 离地间隙≥280mm	12900	
		2. 微型耕耘机	2.1	功率2~4kW微型耕耘机	发动机燃油种类: 柴油或汽油; 2.0kW≤发动机标定功率<4.0kW	590	
			2.2	功率4kW及以上汽油机微型耕耘机	发动机燃油种类: 汽油; 发动机标定功率≥4.0kW	640	
			2.3	功率4kW及以上柴油机微型耕耘机	发动机燃油种类: 柴油; 发动机标定功率≥4.0kW	890	
		3. 深松机	3.1	2~3铲凿铲式深松机	深松部件2、3个; 深松铲结构型式: 凿铲式; 铲间距≥180mm	1200	

续表

大类	小类	品目	档次编号	档次名称	基本配置和参数	中央财政最高补贴额(元)	备注	
			3.2	4~5铲耩铲式深松机	深松部件4、5个； 深松铲结构型式：耩铲式； 铲间距 $\geq 180\text{mm}$	1300	耩铲式深松机档次的深松铲结构型式既包含耩铲式的单一型式，也包含耩铲式和偏柱式的混合型式，相关产品均可按深松部件和铲间距要求投档。	
			3.3	6铲及以上耩铲式深松机	深松部件6个及以上；深松铲结构型式：耩铲式；铲间距 $\geq 180\text{mm}$	2100		
			3.4	2~3铲偏柱式、全方位式深松机	深松部件2、3个； 深松铲结构型式：偏柱式或全方位式；铲间距 $\geq 330\text{mm}$	1600		
			3.5	4~5铲偏柱式、全方位式深松机	深松部件4、5个； 深松铲结构型式：偏柱式或全方位式；铲间距 $\geq 330\text{mm}$	2700		
			3.6	6铲及以上偏柱式、全方位式深松机	深松部件6个及以上； 深松铲结构型式：偏柱式或全方位式； 铲间距 $\geq 330\text{mm}$	3400		
	(二) 整地机械	4. 埋茬起浆机	4.1	单轴2~2.5m埋茬起浆机	单轴； $2\text{m} \leq \text{工作幅宽} < 2.5\text{m}$	1800		
			4.2	单轴2.5m及以上埋茬起浆机	单轴；工作幅宽 $\geq 2.5\text{m}$	2300		
			4.3	双轴2~2.5m埋茬起浆机	双轴； $2\text{m} \leq \text{工作幅宽} < 2.5\text{m}$	2600		
			4.4	双轴2.5m及以上埋茬起浆机	双轴；工作幅宽 $\geq 2.5\text{m}$	3100		
	二、种植施肥机械	(三) 种子播前处理和育苗机械设备	5. 育秧(苗)播种设备	5.1	生产率200~500盘/小时秧盘播种成套设备	$200\text{盘/小时} \leq \text{生产率} < 500\text{盘/小时}$ ； 含铺底土、播种、覆土功能	1700	
				5.2	生产率500盘/小时及以上秧盘播种成套设备	生产率 $\geq 500\text{盘/小时}$ ； 含铺底土、播种、覆土功能	2700	
		(四) 播种机械(可含施肥功能)	6. 条播机	6.1	6行及以下条播机	播种行数 ≤ 6 行；作业幅宽 $\geq 1\text{m}$	1100	
				6.2	7~11行条播机	$7 \leq \text{播种行数} \leq 11$ 行	1300	
6.3				12~18行条播机	$12 \leq \text{播种行数} \leq 18$ 行	1800		

续表

大类	小类	品目	档次编号	档次名称	基本配置和参数	中央财政最高补贴额(元)	备注
			6.4	19~24行条播机	19行≤播种行数≤24行	3800	
			6.5	25行及以上条播机	播种行数≥25行	6000	
			6.6	6行及以下免(少)耕条播机	播种行数≤6行;作业幅宽≥1m	1200	
			6.7	7~11行免(少)耕条播机	7行≤播种行数≤11行	2500	
			6.8	12~18行免(少)耕条播机	12行≤播种行数≤18行	4000	
			6.9	19~24行免(少)耕条播机	19行≤播种行数≤24行	4400	
			6.10	25行及以上免(少)耕条播机	播种行数≥25行	7500	
		7.穴播机	7.1	2~3行穴播机	播种行数2、3行	660	
			7.2	4~5行穴播机	播种行数4、5行	1400	
			7.3	6行及以上穴播机	播种行数≥6行	1700	
			7.4	2~3行免(少)耕穴播机	播种行数2、3行	950	
			7.5	4~5行免(少)耕穴播机	播种行数4、5行	1700	
			7.6	6行及以上免(少)耕穴播机	播种行数≥6行	2700	
		8.单粒(精密)播种机	8.1	2~3行单粒(精密)播种机	播种行数2、3行	790	普通精量播种机
			8.2	4~5行单粒(精密)播种机	播种行数4、5行	1600	
			8.3	6~10行单粒(精密)播种机	6行≤播种行数≤10行	3100	
			8.4	11行及以上单粒(精密)播种机	播种行数≥11行	3700	
			8.5	2~3行免(少)耕单粒(精密)播种机	播种行数2、3行	1000	

续表

大类	小类	品目	档次编号	档次名称	基本配置和参数	中央财政最高补贴额(元)	备注
			8.6	4~5行免(少)耕单粒(精密)播种机	播种行数4、5行	1800	
			8.7	6~10行免(少)耕单粒(精密)播种机	6行≤播种行数≤10行	5200	
			8.8	11行及以上免(少)耕单粒(精密)播种机	播种行数≥11行	6200	
			8.9	2~3行高性能单粒(精密)播种机	播种行数2、3行；排种器数量≥2个；单体结构质量≥110kg；排种器型式：指夹式、气力式；指夹式最低作业速度≥6km/h，气力式最低作业速度≥8km/h；单体独立同步仿形；独立无级或多级镇压机构	5800	高性能单粒(精密)播种机
			8.10	4~5行高性能单粒(精密)播种机	播种行数4、5行；排种器数量≥4个；单体结构质量≥110kg；排种器型式：指夹式、气力式；指夹式最低作业速度≥6km/h，气力式最低作业速度≥8km/h；单体独立同步仿形；独立无级或多级镇压机构	10600	
			8.11	6~10行高性能单粒(精密)播种机	6行≤播种行数≤10行；排种器数量≥6个；单体结构质量≥110kg；排种器型式：指夹式、气力式；指夹式最低作业速度≥6km/h，气力式最低作业速度≥8km/h；单体独立同步仿形；独立无级或多级镇压机构	18800	

大类	小类	品目	档次编号	档次名称	基本配置和参数	中央财政最高补贴额(元)	备注
			8.12	11行及以上高性能单粒(精密)播种机	播种行数 ≥ 11 行;排种器数量 ≥ 11 个;单体结构质量 $\geq 110\text{kg}$;排种器型式:指夹式、气力式;指夹式最低作业速度 $\geq 6\text{km/h}$,气力式最低作业速度 $\geq 8\text{km/h}$;单体独立同步仿形;独立无级或多级镇压机构	25900	
			8.13	2~3行高性能免耕单粒(精密)播种机	播种行数2、3行;排种器数量 ≥ 2 个;单体结构质量 $\geq 130\text{kg}$;排种器型式:指夹式、气力式;指夹式最低作业速度 $\geq 6\text{km/h}$,气力式最低作业速度 $\geq 8\text{km/h}$;单体独立同步仿形;独立无级或多级镇压机构;独立防缠绕式破茬清垄机构	10500	
			8.14	4~5行高性能免耕单粒(精密)播种机	播种行数4、5行;排种器数量 ≥ 4 个;单体结构质量 $\geq 130\text{kg}$;排种器型式:指夹式、气力式;指夹式最低作业速度 $\geq 6\text{km/h}$,气力式最低作业速度 $\geq 8\text{km/h}$;单体独立同步仿形;独立无级或多级镇压机构;独立防缠绕式破茬清垄机构	16900	
			8.15	6~10行高性能免耕单粒(精密)播种机	6行 $\leq$ 播种行数 ≤ 10 行;排种器数量 ≥ 6 个;单体结构质量 $\geq 130\text{kg}$;排种器型式:指夹式、气力式;指夹式最低作业速度 $\geq 6\text{km/h}$,气力式最低作业速度 $\geq 8\text{km/h}$;单体独立同步仿形;独立无级或多级镇压机构;独立防缠绕式破茬清垄机构	29100	

续表

大类	小类	品目	档次编号	档次名称	基本配置和参数	中央财政最高补贴额(元)	备注
			8.16	11行及以上高性能免耕单粒(精密)播种机	播种行数 ≥ 11 行;排种器数量 ≥ 11 个;单体结构质量 $\geq 130\text{kg}$;排种器型式:指夹式、气力式;指夹式最低作业速度 $\geq 6\text{km/h}$,气力式最低作业速度 $\geq 8\text{km/h}$;单体独立同步仿形;独立无级或多级镇压机构;独立防缠绕式破茬清垄机构	45000	
	(五)耕整地播种作业机械(可含施肥功能)	9.旋耕播种机	9.1	工作幅宽2~3m驱动耙播种机	2m $\leq$ 工作幅宽 $< 3\text{m}$;工作行数 ≥ 16 行;最低作业速度 $\geq 8\text{km/h}$;耙组数量 ≥ 8 组;20cm $\leq$ 耙齿间距 $\leq 30\text{cm}$;单体独立仿形;结构型式:驱动耙播;播前播后双镇压机构	18900	小麦高性能播种机
9.2			工作幅宽3m及以上驱动耙播种机	工作幅宽 $\geq 3\text{m}$;工作行数 ≥ 20 行;最低作业速度 $\geq 8\text{km/h}$;耙组数量 ≥ 10 组;20cm $\leq$ 耙齿间距 $\leq 30\text{cm}$;单体独立仿形;结构型式:驱动耙播;播前播后双镇压机构	29300		
	(六)栽植机械	10.插秧机	10.1	4行手扶步进式水稻插秧机	手扶步进式;4行	3800	
10.2			6行及以上手扶步进式水稻插秧机	手扶步进式;6行及以上	4700		
10.3			6行及以上独轮乘坐式水稻插秧机	独轮乘坐式;6行及以上	4500		
10.4			4~5行四轮乘坐式水稻插秧机	四轮乘坐式;4、5行	11100		
10.5			6~7行四轮乘坐式水稻插秧机	四轮乘坐式;6、7行	24900		
10.6			8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机	四轮乘坐式;8行及以上	29100		

续表

大类	小类	品目	档次编号	档次名称	基本配置和参数	中央财政最高补贴额(元)	备注
	(七) 施肥机械	11.侧深施肥装置	11.1	6行及以上手动调肥量水稻侧深施肥装置	工作行数 ≥ 6 行;配套动力型式:6行及以上乘坐式水稻插秧机或水稻直播机;配置强制施肥装置、漏施或堵塞报警装置、插秧或直播同步施肥控制装置	800	
			11.2	6行及以上自动调肥量水稻侧深施肥装置	工作行数 ≥ 6 行;配套动力型式:6行及以上乘坐式水稻插秧机或水稻直播机;配置强制施肥装置、漏施或堵塞报警装置、插秧或直播同步施肥控制装置;具备施肥量动态控制功能	1100	
三、田间管理机械	(八) 植保机械	12.喷雾机	12.1	4~12m悬挂式喷杆喷雾机	4m $\leq$ 喷杆长度 < 12 m;药箱 ≥ 400 L;型式:悬挂式	780	
			12.2	12~18m悬挂式喷杆喷雾机	12m $\leq$ 喷杆长度 < 18 m;药箱 ≥ 600 L;型式:悬挂式	1300	
			12.3	18m及以上悬挂式喷杆喷雾机	喷杆长度 ≥ 18 m;药箱 ≥ 800 L;型式:悬挂式	3400	
			12.4	18m及以上牵引式喷杆喷雾机	喷杆长度 ≥ 18 m;药箱 ≥ 2000 L;型式:牵引式	6800	
			12.5	11~18马力自走式两轮转向喷杆喷雾机	11马力 $\leq$ 功率 < 18 马力;药箱 ≥ 200 L;喷杆长度 ≥ 8 m;离地间隙 ≥ 0.8 m;型式:自走式;两轮驱动、四轮驱动;两轮转向	2400	
			12.6	18~50马力自走式两轮转向喷杆喷雾机	18马力 $\leq$ 功率 < 50 马力;药箱 ≥ 400 L;喷杆长度 ≥ 8 m;离地间隙 ≥ 0.8 m;型式:自走式;两轮驱动、四轮驱动;两轮转向	12700	
			12.7	50~100马力自走式两轮转向喷杆喷雾机	50马力 $\leq$ 功率 < 100 马力;药箱 ≥ 700 L;喷杆长度 ≥ 10 m;离地间隙 ≥ 0.8 m;型式:自走式;两轮驱动、四轮驱动;两轮转向	14400	

续表

大类	小类	品目	档次编号	档次名称	基本配置和参数	中央财政最高补贴额(元)	备注
			12.8	100马力及以上自走式两轮转向喷杆喷雾机	功率 ≥ 100 马力; 药箱 ≥ 1000 L; 喷杆长度 ≥ 20 m; 离地间隙 ≥ 0.8 m; 型式: 自走式; 两轮驱动、四轮驱动; 两轮转向	20200	
			12.9	11~18马力自走式四轮转向喷杆喷雾机	11 马力 $\leq$ 功率 < 18 马力; 药箱 ≥ 200 L; 喷杆长度 ≥ 8 m; 离地间隙 ≥ 0.8 m; 型式: 自走式; 四轮驱动; 四轮转向	5400	
			12.10	18~50马力自走式四轮转向喷杆喷雾机	18 马力 $\leq$ 功率 < 50 马力; 药箱 ≥ 400 L; 喷杆长度 ≥ 8 m; 离地间隙 ≥ 0.8 m; 型式: 自走式; 四轮驱动; 四轮转向	13300	
			12.11	50~100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机	50 马力 $\leq$ 功率 < 100 马力; 药箱 ≥ 700 L; 喷杆长度 ≥ 10 m; 离地间隙 ≥ 0.8 m; 型式: 自走式; 四轮驱动; 四轮转向	15500	
			12.12	100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机	功率 ≥ 100 马力; 药箱 ≥ 1000 L; 喷杆长度 ≥ 20 m; 离地间隙 ≥ 0.8 m; 型式: 自走式; 四轮驱动; 四轮转向	21000	
			12.13	风机叶轮直径330mm及以上风送喷雾机	风机叶轮直径 ≥ 330 mm; 药箱额定容量 ≥ 500 L; 水平射程或喷幅 ≥ 10 m; 结构型式: 牵引式、车载式或自走式	2200	
			12.14	风机叶轮直径480mm及以上风送喷雾机	风机叶轮直径 ≥ 480 mm; 药箱额定容量 ≥ 1000 L; 水平射程或喷幅 ≥ 15.3 m; 结构型式: 牵引式、车载式或自走式	3600	
			12.15	风机叶轮直径800mm及以上风送喷雾机	风机叶轮直径 ≥ 800 mm; 药箱额定容量 ≥ 1200 L; 水平射程或喷幅 ≥ 19.6 m; 结构型式: 牵引式、车载式或自走式	4800	

续表

大类	小类	品目	档次编号	档次名称	基本配置和参数	中央财政最高补贴额(元)	备注
			12.16	遥控电动自走式风送喷雾机(行走动力和风机动力均由电动机提供,不配置柴油或汽油机)	行走电机功率 $\geq 0.6\text{kW}$;药箱容积 $\geq 120\text{L}$;水平射程或喷幅 $\geq 10\text{m}$;锂电池电能容量 $\geq 2000\text{VAh}$;遥控自走式	3600	
			12.17	自走式大豆玉米复合种植喷杆喷雾机	功率 ≥ 18 马力;喷杆长度 $\geq 1850\text{mm}$;离地间隙 $\geq 400\text{mm}$;防飘喷头;雾滴隔离效果:漂移雾滴密度 ≤ 5 个/ cm^2 ;型式:四轮自走式;药箱(水箱)总容量 $\geq 600\text{L}$;喷雾系统配置:双喷雾系统或在线混药系统,具有明显的区分识别标识;搅拌装置:药箱内部应安装搅拌装置;有隔离防护装置,且应垂直于地面并与机具行驶方向平行,前后宽度不小于 500mm ,大豆玉米带间隔离防护装置底端应贴地面;工作幅宽(全部):适用于1个复合种植单元	12700	通过试验验证,明示适应的种植模式,满足农艺要求
		13. 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能)	13.1	10~20L多旋翼植保无人驾驶航空器	10L $\leq$ 药液箱额定容量 $< 20\text{L}$;多旋翼;电动、油动、油电混动;电动须配置智能电池系统,含智能电池2组及以上;具有避障系统;具有RTK的高精度卫星导航定位系统;具有电子围栏	6000	
			13.2	20~30L多旋翼植保无人驾驶航空器	20L $\leq$ 药液箱额定容量 $< 30\text{L}$;多旋翼;电动、油动、油电混动;电动须配置智能电池系统,含智能电池2组及以上;具有避障系统;具有RTK的高精度卫星导航定位系统;具有电子围栏	9000	

续表

大类	小类	品目	档次编号	档次名称	基本配置和参数	中央财政最高补贴额(元)	备注
			13.3	30~50L多旋翼植保无人驾驶航空器	30L≤药液箱额定容量<50L;多旋翼;电动、油动、油电混动;电动须配置智能电池系统,含智能电池2组及以上;具有避障系统;具有RTK的高精度卫星导航定位系统;具有电子围栏	12000	
			13.4	50L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器	药液箱额定容量≥50L;多旋翼;电动、油动、油电混动;电动须配置智能电池系统,含智能电池2组及以上;具有避障系统;具有RTK的高精度卫星导航定位系统;具有电子围栏	14400	1.多旋翼植保无人驾驶航空器是由两个以上旋翼(含两个)组成,并通过多个旋翼在空气中旋转产生升力和拉力实现飞行并进行施药作业的无人飞机。 2.智能电池系统由智能电池和智能电池充电器组成,具备过充保护、过放保护、短路保护和充放电使用次数显示等功能。 3.避障系统是指通过雷达或多目视觉等传感器主动检测障碍物并能实时规避的系统,通常有前避障、前后避障或绕障,不含使用航线规划绕障。
			13.5	15~25L单旋翼植保无人驾驶航空器	15L≤药液箱额定容量<25L;单旋翼;电动、油动、油电混动;电动须配置智能电池系统,含智能电池2组及以上;具有避障系统;具有RTK的高精度卫星导航定位系统;具有电子围栏	9000	
			13.6	25L及以上单旋翼植保无人驾驶航空器	药液箱额定容量≥25L;单旋翼;电动、油动、油电混动;电动须配置智能电池系统,含智能电池2组及以上;具有避障系统;具有RTK的高精度卫星导航定位系统;具有电子围栏	12000	
四、收获机械	(九)粮食作物收获机械	14.谷物联合收割机	14.1	1~3kg/s自走轮式谷物联合收割机(含自走半履带式)	1kg/s≤喂入量<3kg/s;自走轮式(含自走半履带式);喂入方式:全喂入	11700	
			14.2	3~5kg/s自走轮式谷物联合收割机(含自走半履带式)	3kg/s≤喂入量<5kg/s;自走轮式(含自走半履带式);喂入方式:全喂入	15400	

大类	小类	品目	档次编号	档次名称	基本配置和参数	中央财政最高补贴额(元)	备注
			14.3	5~7kg/s自走轮式谷物联合收割机(含自走半履带式)	5kg/s≤喂入量<7kg/s;自走轮式(含自走半履带式);喂入方式:全喂入	35600	
			14.4	7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机(含自走半履带式)	喂入量≥7kg/s;自走轮式(含自走半履带式);喂入方式:全喂入	40300	
			14.5	12kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机(含自走半履带式)	喂入量≥12kg/s;自走轮式(含自走半履带式);喂入方式:全喂入;幅宽≥4.5m;配套动力≥161.8kW	68000	
			14.6	0.6~1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含1~1.5kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入)	0.6kg/s≤喂入量<1kg/s,1kg/s≤水稻机喂入量<1.5kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入	8500	
			14.7	1~1.5kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含1.5~2.1kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入)	1kg/s≤喂入量<1.5kg/s,1.5kg/s≤水稻机喂入量<2.1kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入	10000	
			14.8	1.5~2.1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含2.1~3kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入)	1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s,2.1kg/s≤水稻机喂入量<3kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入	14500	

续表

大类	小类	品目	档次编号	档次名称	基本配置和参数	中央财政最高补贴额(元)	备注
			14.9	2.1~3kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含3~4kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入)	2.1kg/s≤喂入量<3kg/s, 3kg/s≤水稻机喂入量<4kg/s; 自走履带式; 喂入方式: 全喂入	23000	
			14.10	3~4kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含4~6kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入)	3kg/s≤喂入量<4kg/s, 4kg/s≤水稻机喂入量<6kg/s; 自走履带式; 喂入方式: 全喂入	28200	
			14.11	4~6kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含6kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机(全喂入)	4kg/s≤喂入量<6kg/s, 水稻机喂入量≥6kg/s; 自走履带式; 喂入方式: 全喂入	31300	
			14.12	6kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	喂入量≥6kg/s; 自走履带式; 喂入方式: 全喂入	40300	
			14.13	小型收割机	0.3kg/s≤喂入量≤1.5kg/s; 无筛选或简易筛选; 喂入方式: 全喂入; 手扶步进式、履带式或轮式	7500	
			14.14	3行35马力及以上半喂入联合收割机	收获行数: 3行; 喂入方式: 半喂入; 功率≥35马力	18000	
			14.15	4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机	收获行数≥4行; 喂入方式: 半喂入; 功率≥35马力	39400	

大类	小类	品目	档次编号	档次名称	基本配置和参数	中央财政最高补贴额(元)	备注
		15. 玉米收获机	15.1	1~2行玉米收获机	1行、2行割台；结构型式：手扶自走式或自走式；功能型式：果穗收获	1900	
			15.2	1~2行带剥皮功能玉米收获机	1行、2行割台；结构型式：手扶自走式或自走式；功能型式：摘穗剥皮，秸秆粉碎还田	3100	
			15.3	2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	2行割台；1m≤工作幅宽<1.6m；型式：自走式（摘穗剥皮型）	22000	
			15.4	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	3行割台；1.6m≤工作幅宽<2.2m；型式：自走式（摘穗剥皮型）	40100	
			15.5	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	4行割台；2.2m≤工作幅宽<2.8m；型式：自走式（摘穗剥皮型）	57700	
			15.6	5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机	5行及以上割台；工作幅宽≥2.8m；型式：自走式（摘穗剥皮型）	67600	
			15.7	3行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机（窄行距）	3行及以上割台；1m≤工作幅宽<1.6m；型式：自走式（摘穗剥皮型）	22000	
			15.8	4行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机（窄行距）	4行及以上割台；1.6m≤工作幅宽<2.2m；型式：自走式（摘穗剥皮型）	40100	
			15.9	5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机（窄行距）	5行及以上割台；2.2m≤工作幅宽<2.8m；型式：自走式（摘穗剥皮型）	57700	
			15.10	4行自走式玉米籽粒联合收获机	4行割台；2.2m≤工作幅宽<2.8m；型式：自走式	40300	
			15.11	5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机	5行及以上割台；工作幅宽≥2.8m；型式：自走式	68000	

续表

大类	小类	品目	档次编号	档次名称	基本配置和参数	中央财政最高补贴额(元)	备注
			15.12	5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机(窄行距)	5行及以上割台; 2.2m≤工作幅宽<2.8m; 型式: 自走式	40300	
			15.13	2行穗茎兼收玉米收获机	2行割台; 1m≤工作幅宽<1.6m; 型式: 自走式	26800	
			15.14	3行穗茎兼收玉米收获机	3行割台; 1.6m≤工作幅宽<2.2m; 型式: 自走式	45100	
			15.15	4行穗茎兼收玉米收获机	4行割台; 2.2m≤工作幅宽<2.8m; 型式: 自走式	62900	
			15.16	5行及以上穗茎兼收玉米收获机	5行及以上割台; 工作幅宽≥2.8m; 型式: 自走式	72100	
			15.17	3行及以上穗茎兼收玉米收获机(窄行距)	3行及以上割台; 1m≤工作幅宽<1.6m; 型式: 自走式	26800	
			15.18	4行及以上穗茎兼收玉米收获机(窄行距)	4行及以上割台; 1.6m≤工作幅宽<2.2m; 型式: 自走式	45100	
			15.19	5行及以上穗茎兼收玉米收获机(窄行距)	5行及以上割台; 2.2m≤工作幅宽<2.8m; 型式: 自走式	62900	
		16.薯类收获机	16.1	500mm及以上手扶直联薯类挖掘机	工作幅宽≥500mm; 收获型式: 挖掘机; 结构型式: 手扶直联式	1000	
			16.2	700~1000mm薯类挖掘机	700mm≤工作幅宽<1000mm; 收获型式: 挖掘机; 结构型式: 悬挂式、牵引式	1200	
			16.3	1000~1500mm薯类挖掘机	1000mm≤工作幅宽<1500mm; 收获型式: 挖掘机; 结构型式: 悬挂式、牵引式	2700	
			16.4	1500~1700mm薯类挖掘机	1500mm≤工作幅宽<1700mm; 收获型式: 挖掘机; 结构型式: 悬挂式、牵引式	3600	
			16.5	1700mm及以上薯类挖掘机	工作幅宽≥1700mm; 收获型式: 挖掘机; 结构型式: 悬挂式、牵引式	4500	

大类	小类	品目	档次编号	档次名称	基本配置和参数	中央财政最高补贴额(元)	备注
			16.6	1500mm及以上自走式薯类捡拾机	工作幅宽 $\geq$ 1500mm;收获型式:捡拾机;结构型式:自走式;发动机额定功率 $\geq$ 88.2kW	50000	
			16.7	700~1000mm牵引式薯类联合收获机	700mm $\leq$ 工作幅宽 $<$ 1000mm;收获型式:联合收获机;结构型式:牵引式;配置清选分离装置;卸薯方式:即时装袋或集中装车	20400	
			16.8	1000~1500mm牵引式薯类联合收获机	1000mm $\leq$ 工作幅宽 $<$ 1500mm;收获型式:联合收获机;结构型式:牵引式;配置清选分离装置;卸薯方式:即时装袋或集中装车	20400	
			16.9	1500mm及以上牵引式薯类联合收获机	工作幅宽 $\geq$ 1500mm;收获型式:联合收获机;结构型式:牵引式;配置清选分离装置;卸薯方式:即时装袋或集中装车	44000	
			16.10	700~1000mm自走式薯类联合收获机	700mm $\leq$ 工作幅宽 $<$ 1000mm;收获型式:联合收获机;结构型式:自走式;发动机额定功率 $\geq$ 25.8kW;配置清选分离装置;卸薯方式:即时装袋或集中装车	24000	
			16.11	1000~1500mm自走式薯类联合收获机	1000mm $\leq$ 工作幅宽 $<$ 1500mm;收获型式:联合收获机;结构型式:自走式;发动机额定功率 $\geq$ 66.1kW;配置清选分离装置;卸薯方式:即时装袋或集中装车	50000	
			16.12	1500mm及以上自走式薯类联合收获机	工作幅宽 $\geq$ 1500mm;收获型式:联合收获机;结构型式:自走式;发动机额定功率 $\geq$ 88.2kW;配置清选分离装置;卸薯方式:即时装袋或集中装车	60000	

续表

大类	小类	品目	档次编号	档次名称	基本配置和参数	中央财政最高补贴额(元)	备注
			17.1	1~3kg/s自走轮式大豆收获机	结构型式:自走轮式,全喂入; 1kg/s≤喂入量<3kg/s;拨禾轮型式:弹齿式	11700	
			17.2	3~5kg/s自走轮式大豆收获机	结构型式:自走轮式,全喂入; 3kg/s≤喂入量<5kg/s;拨禾轮型式:弹齿式	15400	
			17.3	5~7kg/s自走轮式大豆收获机	结构型式:自走轮式,全喂入; 5kg/s≤喂入量<7kg/s;拨禾轮型式:弹齿式	35600	
			17.4	7~12kg/s自走轮式大豆收获机	结构型式:自走轮式,全喂入; 7kg/s≤喂入量<12kg/s;拨禾轮型式:弹齿式	40300	
			17.5	12kg/s及以上自走轮式大豆收获机	结构型式:自走轮式,全喂入;喂入量≥12kg/s;拨禾轮型式:弹齿式	68000	
			17.6	0.6~1kg/s自走履带式大豆收获机	结构型式:自走履带式,全喂入; 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s;拨禾轮型式:弹齿式	8500	
			17.7	1~1.5kg/s自走履带式大豆收获机	结构型式:自走履带式,全喂入; 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s;拨禾轮型式:弹齿式	10000	
			17.8	1.5~2.1kg/s自走履带式大豆收获机	结构型式:自走履带式,全喂入; 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s;拨禾轮型式:弹齿式	14500	
			17.9	2.1~3kg/s自走履带式大豆收获机	结构型式:自走履带式,全喂入; 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s;拨禾轮型式:弹齿式	23000	
			17.10	3~4kg/s自走履带式大豆收获机	结构型式:自走履带式,全喂入; 3kg/s≤喂入量<4kg/s;拨禾轮型式:弹齿式	28200	
			17.11	4~6kg/s自走履带式大豆收获机	结构型式:自走履带式,全喂入; 4kg/s≤喂入量<6kg/s;拨禾轮型式:弹齿式	31300	
			17.12	6kg/s及以上自走履带式大豆收获机	结构型式:自走履带式,全喂入;喂入量≥6kg/s;拨禾轮型式:弹齿式	40300	

大类	小类	品目	档次编号	档次名称	基本配置和参数	中央财政最高补贴额(元)	备注
		18. 油菜籽收获机	18.1	1~3kg/s自走轮式油菜籽收获机	1kg/s≤喂入量<3kg/s; 自走轮式	11700	
			18.2	3~5kg/s自走轮式油菜籽收获机	3kg/s≤喂入量<5kg/s; 自走轮式	15400	
			18.3	5~7kg/s自走轮式油菜籽收获机	5kg/s≤喂入量<7kg/s; 自走轮式	35600	
			18.4	7kg/s及以上自走轮式油菜籽收获机	喂入量≥7kg/s; 自走轮式	40300	
			18.5	0.6~1kg/s自走履带式油菜籽收获机	0.6kg/s≤喂入量<1kg/s; 自走履带式	8500	
			18.6	1~1.5kg/s自走履带式油菜籽收获机	1kg/s≤喂入量<1.5kg/s; 自走履带式	10000	
			18.7	1.5~2.1kg/s自走履带式油菜籽收获机	1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s; 自走履带式	14500	
			18.8	2.1~3kg/s自走履带式油菜籽收获机	2.1kg/s≤喂入量<3kg/s; 自走履带式	23000	
			18.9	3~4kg/s自走履带式油菜籽收获机	3kg/s≤喂入量<4kg/s; 自走履带式	28200	
			18.10	4~6kg/s自走履带式油菜籽收获机	4kg/s≤喂入量<6kg/s; 自走履带式	31300	
			18.11	6kg/s及以上自走履带式油菜籽收获机	喂入量≥6kg/s; 自走履带式	40300	
	(十一) 秸秆收集处理机械	19. 秸秆粉碎还田机	19.1	1~1.5m秸秆粉碎还田机	1m≤作业幅宽<1.5m	1000	
			19.2	1.5~2m秸秆粉碎还田机	1.5m≤作业幅宽<2m	1800	
			19.3	2~2.5m秸秆粉碎还田机	2m≤作业幅宽<2.5m	2100	

续表

大类	小类	品目	档次编号	档次名称	基本配置和参数	中央财政最高补贴额(元)	备注
			19.4	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	作业幅宽 $\geq 2.5\text{m}$	2800	
	(十二) 收获割台	20. 大豆收获专用割台	20.1	1.5m及以上大豆收获专用割台	工作幅宽 $\geq 1.5\text{m}$; 拨禾轮拨指材料: 非金属	1200	
20.2			2.5~5m大豆收获挠性专用割台	2.5m $\leq$ 工作幅宽 $< 5\text{m}$; 结构型式: 全喂入挠式; 仿形机构型式: 四连杆机械仿形或电液控制液压仿形; 仿形量(垂直水平面方向) $\geq 90\text{mm}$	7200		
20.3			5m及以上大豆收获挠性专用割台	工作幅宽 $\geq 5\text{m}$; 结构型式: 全喂入挠式; 仿形机构型式: 四连杆机械仿形或电液控制液压仿形; 仿形量(垂直水平面方向) $\geq 90\text{mm}$	12000		
五、饲料(草)收获加工运输设备	(十三) 饲料(草)收获机械	21. 打(压)捆机	21.1	压缩室截面积(宽 $\times$ 高) 0.1344m^2 及以上方捆捡拾压捆机	方捆; 压缩室截面积(宽 $\times$ 高) $\geq 0.1344\text{m}^2$; 打结器数量 ≥ 2 个; 捡拾宽度 $\geq 1.2\text{m}$	9200	
			21.2	压缩室截面积(宽 $\times$ 高) 0.154m^2 及以上方捆捡拾压捆机	方捆; 压缩室截面积(宽 $\times$ 高) $\geq 0.154\text{m}^2$; 打结器数量 ≥ 2 个; 捡拾宽度 $\geq 1.7\text{m}$	13800	
			21.3	压缩室截面积(宽 $\times$ 高) 0.162m^2 及以上方捆捡拾压捆机	方捆; 压缩室截面积(宽 $\times$ 高) $\geq 0.162\text{m}^2$; 打结器数量 ≥ 2 个; 捡拾宽度 $\geq 2.2\text{m}$	19900	
			21.4	压缩室截面积(宽 $\times$ 高) 0.1998m^2 及以上方捆捡拾压捆机(3个及以上打结器)	方捆; 压缩室截面积(宽 $\times$ 高) $\geq 0.1998\text{m}^2$; 打结器数量 ≥ 3 个; 捡拾宽度 $\geq 2.2\text{m}$	25900	
			21.5	压缩室直径 0.5m 及以上圆捆捡拾压捆机	圆捆; 压缩室直径 $\geq 0.5\text{m}$; 压缩室宽度 $\geq 0.7\text{m}$; 捡拾宽度 $\geq 0.7\text{m}$	5400	
			21.6	压缩室直径 0.8m 及以上圆捆捡拾压捆机	圆捆; 压缩室直径 $\geq 0.8\text{m}$; 压缩室宽度 $\geq 0.8\text{m}$; 捡拾宽度 $\geq 1.2\text{m}$	10300	

续表

大类	小类	品目	档次编号	档次名称	基本配置和参数	中央财政最高补贴额(元)	备注
			21.7	压缩室直径1m及以上圆捆捡拾压捆机	圆捆; 压缩室直径 $\geq 1m$; 压缩室宽度 $\geq 1m$; 捡拾宽度 $\geq 1.7m$	13800	
			21.8	压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机	圆捆; 压缩室直径 $\geq 1.2m$; 压缩室宽度 $\geq 1.2m$; 捡拾宽度 $\geq 2.2m$	20600	
			21.9	压缩室直径0.52m及以上圆捆压捆机	圆捆; 压缩室直径 $\geq 0.52m$; 压缩室宽度 $\geq 0.52m$; 功率 $\geq 4kW$	5400	
			21.10	压缩室截面积(宽 $\times$ 高) $\geq 0.081m^2$ 及以上方捆压捆机	方捆; 压缩室截面积(宽 $\times$ 高) $\geq 0.081m^2$; $7.5kW \leq$ 功率 $< 15kW$	2300	
			21.11	压缩室截面积(宽 $\times$ 高) $\geq 0.105m^2$ 及以上方捆压捆机	方捆; 压缩室截面积(宽 $\times$ 高) $\geq 0.105m^2$; 功率 $\geq 15kW$	5000	
			21.12	压缩室截面积(宽 $\times$ 高) $\geq 0.0936m^2$ 及以上无打结器自动套袋方捆捡拾压捆机	方捆; 压缩室截面积(宽 $\times$ 高) $\geq 0.0936m^2$; 捡拾宽度 $\geq 1.7m$; 自动套袋(网)	13800	
			21.13	压缩室截面积(宽 $\times$ 高) $\geq 0.1344m^2$ 及以上无打结器自动套袋方捆捡拾压捆机	方捆; 压缩室截面积(宽 $\times$ 高) $\geq 0.1344m^2$; 捡拾宽度 $\geq 2.2m$; 自动套袋(网)	19900	
			21.14	压缩室直径1m及以上带割台自走式圆捆打捆机	圆捆; 自走式; 捡拾宽度 $\geq 1.7m$; 压缩室直径 $\geq 1m$; 压缩室宽度 $\geq 0.85m$; 捡拾器结构型式: 圆盘式割台	50000	工作部件和行走装置由自带发动机驱动, 并且在行走过程中利用自带收获或捡拾台等部件对作物连续完成收获、打捆作业过程的机械。

续表

大类	小类	品目	档次编号	档次名称	基本配置和参数	中央财政最高补贴额(元)	备注
		22.青(黄)饲料收获机	22.1	0.9~1.1m悬挂单圆盘式青饲料收获机	悬挂单圆盘式; 0.9m≤割幅<1.1m	4500	
			22.2	1.1m及以上悬挂单圆盘式青饲料收获机	悬挂单圆盘式; 割幅≥1.1m	8000	
			22.3	0.9~1.1m悬挂双圆盘式青饲料收获机	悬挂双圆盘式; 0.9m≤割幅<1.1m	5400	
			22.4	1.1~2.1m悬挂双圆盘式青饲料收获机	悬挂双圆盘式; 1.1m≤割幅<2.1m	9000	
			22.5	2.1~2.2m悬挂双圆盘式青饲料收获机	悬挂双圆盘式; 2.1m≤割幅<2.2m	14700	
			22.6	2.2m及以上悬挂双圆盘式青饲料收获机	悬挂双圆盘式; 割幅≥2.2m	15500	
			22.7	2.2m及以上悬挂其他式青饲料收获机	悬挂其他式; 割幅≥2.2m	10500	割台切割器型式不包含甩刀(锤爪)式。
			22.8	1.1m及以上牵引式青饲料收获机	牵引式; 割幅≥1.1m	6300	
			22.9	2~2.6m自走圆盘式青饲料收获机	自走圆盘式; 2m≤割幅<2.6m; 籽粒破碎机构: 无或非对辊式; 配套发动机功率≥110kW	63600	
			22.10	2~2.6m自走圆盘式青饲料收获机, 带对辊式籽粒破碎机构	自走圆盘式; 2m≤割幅<2.6m; 籽粒破碎机构: 对辊式; 配套发动机功率≥115kW	73600	
			22.11	2.6m及以上自走圆盘式青饲料收获机	自走圆盘式; 割幅≥2.6m; 籽粒破碎机构: 无或非对辊式; 配套发动机功率≥130kW	101900	

大类	小类	品目	档次编号	档次名称	基本配置和参数	中央财政最高补贴额(元)	备注
			22.12	2.6m及以上自走圆盘式青饲料收获机,带对辊式籽粒破碎机构	自走圆盘式;割幅 $\geq 2.6\text{m}$;籽粒破碎机构:对辊式;配套发动机功率 $\geq 150\text{kW}$	111900	
			22.13	1.8~2.2m自走其他式青饲料收获机	自走其他式;1.8m $\leq$ 割幅 $< 2.2\text{m}$;籽粒破碎机构:无或非对辊式;配套发动机功率 $\geq 90\text{kW}$	40300	
			22.14	1.8~2.2m自走其他式青饲料收获机,带对辊式籽粒破碎机构	自走其他式;1.8m $\leq$ 割幅 $< 2.2\text{m}$;籽粒破碎机构:对辊式;配套发动机功率 $\geq 105\text{kW}$	51300	
			22.15	2.2~2.6m自走其他式青饲料收获机	自走其他式;2.2m $\leq$ 割幅 $< 2.6\text{m}$;籽粒破碎机构:无或非对辊式;配套发动机功率 $\geq 115\text{kW}$	53300	
			22.16	2.2~2.6m自走其他式青饲料收获机,带对辊式籽粒破碎机构	自走其他式;2.2m $\leq$ 割幅 $< 2.6\text{m}$;籽粒破碎机构:对辊式;配套发动机功率 $\geq 115\text{kW}$	59300	
			22.17	2.6~2.9m自走其他式青饲料收获机	自走其他式;2.6m $\leq$ 割幅 $< 2.9\text{m}$;籽粒破碎机构:无或非对辊式;配套发动机功率 $\geq 150\text{kW}$	63600	
			22.18	2.6~2.9m自走其他式青饲料收获机,带对辊式籽粒破碎机构	自走其他式;2.6m $\leq$ 割幅 $< 2.9\text{m}$;籽粒破碎机构:对辊式;配套发动机功率 $\geq 150\text{kW}$	69600	
			22.19	2.9m及以上自走其他式青饲料收获机	自走其他式;割幅 $\geq 2.9\text{m}$;籽粒破碎机构:无或非对辊式;配套发动机功率 $\geq 190\text{kW}$	95900	
			22.20	2.9m及以上自走其他式青饲料收获机,带对辊式籽粒破碎机构	自走其他式;割幅 $\geq 2.9\text{m}$;籽粒破碎机构:对辊式;配套发动机功率 $\geq 215\text{kW}$	107200	

续表

大类	小类	品目	档次编号	档次名称	基本配置和参数	中央财政最高补贴额(元)	备注
六、畜禽产品采集储运设备	(十四) 畜禽产品采集设备	23. 挤奶机	23.1	1杯组手动移动式挤奶机	杯组数: 1; 脱杯方式: 手动; 型式: 移动式	1200	
			23.2	2杯组手动移动式挤奶机	杯组数: 2; 脱杯方式: 手动; 型式: 移动式	1800	
			23.3	24~40杯组鱼骨式挤奶机	24≤杯组数<40; 型式: 鱼骨式; 脉动器型式: 电子; 计量方式: 电子计量; 脱杯方式: 自动	90900	
			23.4	40杯组及以上鱼骨式挤奶机	杯组数≥40; 型式: 鱼骨式; 脉动器型式: 电子; 计量方式: 电子计量; 脱杯方式: 自动	120000	
			23.5	16~20杯组并列式挤奶机	16≤杯组数<20; 型式: 并列式; 脉动器型式: 电子; 计量方式: 电子计量; 脱杯方式: 自动	100000	
			23.6	20杯组及以上并列(转盘)式挤奶机	杯组数≥20; 型式: 并列(转盘)式; 脉动器型式: 电子; 计量方式: 电子计量; 脱杯方式: 自动	120000	
			23.7	自动挤奶设备	套杯时间≤120s	120000	
		24. 生鲜乳速冷设备	24.1	速冷设备	额定生产率≥1500L/h	50000	
		25. 散装乳冷藏罐	25.1	1000~3000L非全自动清洗冷藏罐	1000L≤容量<3000L; 清洗方式: 非全自动清洗	3500	
			25.2	3000~6000L非全自动清洗冷藏罐	3000L≤容量<6000L; 清洗方式: 非全自动清洗	10300	
			25.3	6000L及以上非全自动清洗冷藏罐	容量≥6000L; 清洗方式: 非全自动清洗	19200	
			25.4	1000~3000L全自动清洗冷藏罐	1000L≤容量<3000L; 清洗方式: 全自动清洗	3800	
			25.5	3000~6000L全自动清洗冷藏罐	3000L≤容量<6000L; 清洗方式: 全自动清洗	10800	

续表

大类	小类	品目	档次编号	档次名称	基本配置和参数	中央财政最高补贴额(元)	备注
			25.6	6000L及以上全自动清洗冷藏罐	容量≥6000L;清洗方式:全自动清洗	21200	
	(十五) 畜禽产品储运设备	26. 储奶罐	26.1	3000~6000L储奶罐	3000L≤容量<6000L	7200	
			26.2	6000~12000L储奶罐	6000L≤容量<12000L	14700	
			26.3	12000~20000L储奶罐	12000L≤容量<20000L	17700	
			26.4	20000L及以上储奶罐	容量≥20000L	20700	
					27.1	批处理量1~4t移动式谷物烘干机	1t≤批处理量<4t;移动式
			27.2	批处理量4t及以上移动式谷物烘干机	批处理量≥4t;移动式	12600	
			27.3	批处理量1~4t循环式谷物烘干机	1t≤批处理量<4t;循环式	6400	
			27.4	批处理量4~10t循环式谷物烘干机	4t≤批处理量<10t;循环式	16800	
			27.5	批处理量10~20t循环式谷物烘干机	10t≤批处理量<20t;循环式	25300	
			27.6	批处理量20~30t循环式谷物烘干机	20t≤批处理量<30t;循环式	30600	
			27.7	批处理量30t及以上循环式谷物烘干机	批处理量≥30t;循环式	48400	
			27.8	处理量20~50t/d连续式谷物烘干机	20t/d≤处理量<50t/d;连续式	15000	
			27.9	处理量50~100t/d连续式谷物烘干机	50t/d≤处理量<100t/d;连续式	31000	
七、粮油糖初加工机械	(十六) 粮食初加工机械	27. 谷物(粮食)干燥机(烘干机)					

续表

大类	小类	品目	档次编号	档次名称	基本配置和参数	中央财政最高补贴额(元)	备注
			27.10	处理量100~300t/d连续式谷物烘干机	100t/d≤处理量<300t/d; 连续式	71200	
			27.11	处理量300t/d及以上连续式谷物烘干机	处理量≥300t/d; 连续式	120000	
			27.12	装载量3~5t批式静态谷物烘干机	3t≤装载量<5t; 批式静态	5400	
			27.13	装载量5t及以上批式静态谷物烘干机	装载量≥5t; 批式静态	9900	
八、农用动力机械	(十七) 拖拉机	28. 轮式拖拉机	28.1	20马力以下两轮驱动拖拉机	功率<20马力; 驱动方式: 两轮驱动	1000	不含皮带传动轮式拖拉机。
			28.2	20~30马力两轮驱动拖拉机	20马力≤功率<30马力; 驱动方式: 两轮驱动	2800	
			28.3	30~40马力两轮驱动拖拉机	30马力≤功率<40马力; 驱动方式: 两轮驱动	4500	
			28.4	40~50马力两轮驱动拖拉机	40马力≤功率<50马力; 驱动方式: 两轮驱动	4900	
			28.5	50~60马力两轮驱动拖拉机	50马力≤功率<60马力; 驱动方式: 两轮驱动	5400	
			28.6	60~70马力两轮驱动拖拉机	60马力≤功率<70马力; 驱动方式: 两轮驱动	6300	
			28.7	70~80马力两轮驱动拖拉机	70马力≤功率<80马力; 驱动方式: 两轮驱动	7800	
			28.8	80~90马力两轮驱动拖拉机	80马力≤功率<90马力; 驱动方式: 两轮驱动	8200	
			28.9	90~100马力两轮驱动拖拉机	90马力≤功率<100马力; 驱动方式: 两轮驱动	10800	
			28.10	100马力及以上两轮驱动拖拉机	功率≥100马力; 驱动方式: 两轮驱动	15300	
			28.11	20马力以下四轮驱动拖拉机	功率<20马力; 驱动方式: 四轮驱动	1200	不含皮带传动轮式拖拉机。

续表

大类	小类	品目	档次编号	档次名称	基本配置和参数	中央财政最高补贴额(元)	备注
			28.12	20~30马力四轮驱动拖拉机	20马力≤功率<30马力; 驱动方式: 四轮驱动	3700	
			28.13	30~40马力四轮驱动拖拉机	30马力≤功率<40马力; 驱动方式: 四轮驱动	5500	
			28.14	40~50马力四轮驱动拖拉机	40马力≤功率<50马力; 驱动方式: 四轮驱动	6200	
			28.15	50~60马力四轮驱动拖拉机	50马力≤功率<60马力; 驱动方式: 四轮驱动	6700	
			28.16	60~70马力四轮驱动拖拉机	60马力≤功率<70马力; 驱动方式: 四轮驱动	8600	
			28.17	70~80马力四轮驱动拖拉机	70马力≤功率<80马力; 驱动方式: 四轮驱动	9800	
			28.18	80~90马力四轮驱动拖拉机	80马力≤功率<90马力; 驱动方式: 四轮驱动	13300	
			28.19	90~100马力四轮驱动拖拉机	90马力≤功率<100马力; 驱动方式: 四轮驱动	15000	
			28.20	100~120马力四轮驱动拖拉机	100马力≤功率<120马力; 驱动方式: 四轮驱动	15300	
			28.21	120~140马力四轮驱动拖拉机	120马力≤功率<140马力; 驱动方式: 四轮驱动	20400	70马力及以上四轮驱动拖拉机, 建议各省按照本地实际使用环境, 设定具体最小使用比质量参数值。最小使用比质量(kg/kW)=最小使用质量/配套发动机标定功率。
			28.22	140~160马力四轮驱动拖拉机	140马力≤功率<160马力; 驱动方式: 四轮驱动	25300	
			28.23	160~180马力四轮驱动拖拉机	160马力≤功率<180马力; 驱动方式: 四轮驱动	26600	
			28.24	180~200马力四轮驱动拖拉机	180马力≤功率<200马力; 驱动方式: 四轮驱动	30600	
			28.25	200马力及以上四轮驱动拖拉机	功率≥200马力; 驱动方式: 四轮驱动	38600	
			28.26	80~90马力四轮驱动动力换挡拖拉机	80马力≤功率<90马力; 驱动方式: 四轮驱动; 换挡方式: 部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速	20600	

续表

大类	小类	品目	档次编号	档次名称	基本配置和参数	中央财政最高补贴额(元)	备注
			28.27	90~100马力四轮驱动动力换挡拖拉机	90马力 $\leq$ 功率 $<$ 100马力; 驱动方式: 四轮驱动; 换挡方式: 部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速	23600	
			28.28	100~120马力四轮驱动动力换挡拖拉机	100马力 $\leq$ 功率 $<$ 120马力; 驱动方式: 四轮驱动; 换挡方式: 部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速	26600	
			28.29	120~140马力四轮驱动动力换挡拖拉机	120马力 $\leq$ 功率 $<$ 140马力; 驱动方式: 四轮驱动; 换挡方式: 部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速	38900	
			28.30	140~160马力四轮驱动动力换挡拖拉机	140马力 $\leq$ 功率 $<$ 160马力; 驱动方式: 四轮驱动; 换挡方式: 部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速	41900	
			28.31	160~180马力四轮驱动动力换挡拖拉机	160马力 $\leq$ 功率 $<$ 180马力; 驱动方式: 四轮驱动; 换挡方式: 部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速	48500	
			28.32	180~200马力四轮驱动动力换挡拖拉机	180马力 $\leq$ 功率 $<$ 200马力; 驱动方式: 四轮驱动; 换挡方式: 部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速	54000	
			28.33	200马力及以上四轮驱动动力换挡拖拉机	功率 $\geq$ 200马力; 驱动方式: 四轮驱动; 换挡方式: 部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速	72200	
			28.34	80~90马力四轮驱动动力换挡智控拖拉机	80马力 $\leq$ 功率 $<$ 90马力; 驱动方式: 四轮驱动; 换挡方式: 部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速; 智能控制	22300	

大类	小类	品目	档次编号	档次名称	基本配置和参数	中央财政最高补贴额(元)	备注
			28.35	90~100马力四轮驱动动力换挡智控拖拉机	90马力≤功率<100马力; 驱动方式: 四轮驱动; 换挡方式: 部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速; 智能控制	25300	1.70马力及以上四轮驱动拖拉机, 建议各省按照本地实际使用环境, 设定具体最小使用比质量参数值。最小使用比质量(kg/kW)=最小使用质量/配套发动机标定功率。 2.智能控制是指具备电液控制三点悬挂装置及以下至少一项功能: 电液控制四轮驱动、电液控制动力输出轴、电液控制多路阀、电控液压转向。
			28.36	100~120马力四轮驱动动力换挡智控拖拉机	100马力≤功率<120马力; 驱动方式: 四轮驱动; 换挡方式: 部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速; 智能控制	28300	
			28.37	120~140马力四轮驱动动力换挡智控拖拉机	120马力≤功率<140马力; 驱动方式: 四轮驱动; 换挡方式: 部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速; 智能控制	40600	
			28.38	140~160马力四轮驱动动力换挡智控拖拉机	140马力≤功率<160马力; 驱动方式: 四轮驱动; 换挡方式: 部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速; 智能控制	43600	
			28.39	160~180马力四轮驱动动力换挡智控拖拉机	160马力≤功率<180马力; 驱动方式: 四轮驱动; 换挡方式: 部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速; 智能控制	51000	
			28.40	180~200马力四轮驱动动力换挡智控拖拉机	180马力≤功率<200马力; 驱动方式: 四轮驱动; 换挡方式: 部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速; 智能控制	56500	
			28.41	200马力及以上四轮驱动动力换挡智控拖拉机	功率≥200马力; 驱动方式: 四轮驱动; 换挡方式: 部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速; 智能控制	74700	
		29.履带式拖拉机	29.1	80~100马力重型履带式拖拉机	80马力≤功率<100马力; 驱动方式: 履带式; 最小使用质量≥6000kg	47200	
			29.2	100~130马力重型履带式拖拉机	100马力≤功率<130马力; 驱动方式: 履带式; 最小使用质量≥6500kg	58300	

续表

大类	小类	品目	档次编号	档次名称	基本配置和参数	中央财政最高补贴额(元)	备注
			29.3	130~160马力重型履带式拖拉机	130马力 $\leq$ 功率 $<$ 160马力; 驱动方式: 履带式; 最小使用质量 $\geq$ 7000kg	82200	
			29.4	160马力及以上重型履带式拖拉机	功率 $\geq$ 160马力; 驱动方式: 履带式; 最小使用质量 $\geq$ 8000kg	102600	
			29.5	50~70马力差速转向履带式拖拉机	50马力 $\leq$ 功率 $<$ 70马力; 驱动方式: 履带式; 转向型式: 差速式转向; 最大牵引功率 $\geq$ 70%发动机标定功率; 最小使用比质量 $\geq$ 35kg/kW	21200	
			29.6	70~90马力差速转向履带式拖拉机	70马力 $\leq$ 功率 $<$ 90马力; 驱动方式: 履带式; 转向型式: 差速式转向; 最大牵引功率 $\geq$ 70%发动机标定功率; 最小使用比质量 $\geq$ 35kg/kW	28500	
			29.7	90~110马力差速转向履带式拖拉机	90马力 $\leq$ 功率 $<$ 110马力; 驱动方式: 履带式; 转向型式: 差速式转向; 最大牵引功率 $\geq$ 70%发动机标定功率; 最小使用比质量 $\geq$ 35kg/kW	36200	
			29.8	110~130马力差速转向履带式拖拉机	110马力 $\leq$ 功率 $<$ 130马力; 驱动方式: 履带式; 转向型式: 差速式转向; 最大牵引功率 $\geq$ 70%发动机标定功率; 最小使用比质量 $\geq$ 40kg/kW	42200	
			29.9	130~150马力差速转向履带式拖拉机	130马力 $\leq$ 功率 $<$ 150马力; 驱动方式: 履带式; 转向型式: 差速式转向; 最大牵引功率 $\geq$ 70%发动机标定功率; 最小使用比质量 $\geq$ 40kg/kW	48200	
			29.10	150马力及以上差速转向履带式拖拉机	功率 $\geq$ 150马力; 驱动方式: 履带式; 转向型式: 差速式转向; 最大牵引功率 $\geq$ 70%发动机标定功率; 最小使用比质量 $\geq$ 40kg/kW	54200	

续表

大类	小类	品目	档次编号	档次名称	基本配置和参数	中央财政最高补贴额(元)	备注
			29.11	50~70马力轻型履带式拖拉机	50马力≤功率<70马力; 驱动方式: 履带式; 橡胶履带	14400	
			29.12	70~100马力轻型履带式拖拉机	70马力≤功率≤100马力; 驱动方式: 履带式; 橡胶履带	17200	
			29.13	50~70马力差速转向轻型履带式拖拉机	50马力≤功率<70马力; 驱动方式: 履带式; 转向型式: 差速式转向; 橡胶履带	17200	
			29.14	70~100马力差速转向轻型履带式拖拉机	70马力≤功率≤100马力; 驱动方式: 履带式; 转向型式: 差速式转向; 橡胶履带	20600	
九、农用搬运机械	(十八) 农用运输机械	30. 田间搬运机械	30.1	功率4.0kW及以上自走履带式田间搬运机械	标定功率≥4.0kW; 额定载质量≥200kg; 结构型式: 自走履带式	1000	
十、农田基本建设机械	(十九) 平地机械(限与拖拉机配套)	31. 平地机	31.1	幅宽2~3m激光平地机	2m≤幅宽<3m; 控制方式: 激光控制; 限与拖拉机配套	7400	
			31.2	幅宽3m及以上激光平地机	幅宽≥3m; 控制方式: 激光控制; 限与拖拉机配套	8900	

附件 2

农机购置与应用补贴机具补贴额一览表(格式)

大类	小类	品目	档次编号	档次名称	基本配置和参数	中央财政补贴额(元)	备注

中华人民共和国农业农村部公告

第 819 号

为更好提供政府信息公开服务,方便公民、法人和其他组织依法获取本机关的政府信息,根据《中华人民共和国政府信息公开条例》,我部组织对中华人民共和国农业部公告第2254号(《农业部信息公开指南》)进行了修订。现将修订后的《农业农村部政府信息公开指南》予以发布,自发布之日起实施。原公告第2254号同时废止。

特此公告。

附件:农业农村部政府信息公开指南

农业农村部
2024年8月19日

附件

农业农村部政府信息公开指南

一、主动公开

(一) 公开范围

主动公开范围参见《农业农村部主动公开基本目录》(网址: http://www.moa.gov.cn/govpublic/BGT/202206/t20220607_6401746.htm)。

(二) 公开渠道

农业农村部主动公开的政府信息,通过农业农村部官网(网址: <https://www.moa.gov.cn>),农业农村部公告、公报,新闻发布会或其他相关会议,广播、电视、报刊、网络等途径予以公开。其中,农业农村部官网是政府信息公开的主要平台。

(三) 查询方式

公民、法人和其他组织可登录农业农村部官

网使用关键词进行检索获取信息。

二、依申请公开

公民、法人和其他组织可以向农业农村部申请获取相关政府信息。

(一) 受理机构

机构名称: 农业农村部办公厅
办公地址: 北京市朝阳区农展馆南里11号
邮政编码: 100125
联系电话: (010) 59192048
传真号码: (010) 59192048
办公时间: 8:00—11:30 13:30—17:00 (节假日除外)

(二) 申请方式

申请人可通过在线申请、邮寄信函、传真、现场申请等方式向农业农村部提出政府信息公开申请。

(三) 申请流程

1. 信息公开申请的提出

申请人应当填写《农业农村部信息公开申请表》(网址: <http://www.moa.gov.cn/ysqgk/zxbs01/wssq.jsp>), 在线直接提交或以信函、传真等方式提交。其中, 以信函方式提交的申请, 应当在信封左下角标注“信息公开申请”字样。

申请人应对申请材料的真实性负责, 政府信息公开申请应当包括下列内容:

(1) 申请人的姓名或者名称、身份证明、联系方式;

(2) 申请公开的政府信息的名称、文号或者便于农业农村部查询的其他特征性描述;

(3) 申请公开的政府信息的形式要求, 包括获取信息的方式、途径。

为提高申请答复效率和质量, 请尽量详细、明确、具体地描述所申请答复的信息, 并提供有效准确的联系方式、联系地址。

2. 信息公开申请的答复

农业农村部自收到信息公开申请之日起20个工作日内予以答复。需要延长答复期限的, 应当经政府信息公开工作机构负责人同意并告知申请人, 延长的期限最长不得超过20个工作日。申请公开的信息涉及第三方合法权益的, 征求第三方

意见所需时间不计算在答复期限内。

根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)第三十五条规定, 申请人申请公开政府信息的数量、频次明显超过合理范围, 农业农村部可以要求申请人说明理由。农业农村部认为申请理由不合理的, 告知申请人不予处理; 农业农村部认为申请理由合理, 但是无法在《条例》第三十三条规定的期限内答复申请人的, 可以确定延迟答复的合理期限并告知申请人。

(四) 信息公开申请的收费

农业农村部依申请提供政府信息, 不收取费用。但是申请人申请公开政府信息的数量、频次明显超过合理范围的, 农业农村部可以根据《条例》第四十二条规定和《国务院办公厅关于印发〈政府信息公开信息处理费管理办法〉的通知》(国办函〔2020〕109号)收取信息处理费。

(五) 责任义务和隐私保护

申请人对申请公开政府信息的使用应符合国家有关法律法规规定。如果申请人恶意修改和非法使用农业农村部提供的信息, 农业农村部将保留依法追究申请人法律责任的权利。

三、信息公开监督

公民、法人和其他组织认为农业农村部在信息公开工作中侵犯其合法权益的, 可以依法申请行政复议或者提起行政诉讼。

中华人民共和国农业农村部公告

第 823 号

根据《兽药管理条例》和《兽药注册办法》规定，经审查，批准广东众宠生物科技有限公司等8家单位申报的米氮平软膏等2种兽药产品为新兽药，核发《新兽药注册证书》，发布产品工艺规程、质量标准、说明书和标签，自发布之日起执行。

批准中牧实业股份有限公司申报的牛口蹄疫病毒O型结构蛋白间接ELISA抗体检测试剂盒注册，发布产品工艺规程、质量标准、说明书和标签，自发布之日起执行。

批准洛阳普泰生物技术有限公司等3家单位申报的猫泛白细胞减少症病毒胶体金检测试纸条兽药产品变更注册，发布修订后的工艺规程、质量标准、说明书和标签，自发布之日起执行；批准洛阳惠中兽药有限公司等4家单位申报的双葛止泻口服液等2种兽药产品变更注册，发布修订后的说明书和标签，自发布之日起执行；批准山东齐发药业有限公司申报的莫能菌素预混剂兽药产品变更注册，发布修订后的说明书和标签、残留检测方法标准（试行），自发布之日起执行。

特此公告。

- 附件：1. 新兽药注册目录
2. 兽药变更注册目录
3. 工艺规程
4. 质量标准
5. 说明书和标签
6. 残留检测方法标准（试行）

农业农村部
2024年9月4日

附件1

新兽药注册目录

新兽药名称	研制单位	类别	新兽药注册证书号	监测期
米氮平软膏	广东众宠生物科技有限公司、青岛欧博方医药科技有限公司、广东温氏大华农生物科技有限公司动物保健品厂、华农（肇庆）生物产业技术研究院有限公司、北京欧博方医药科技有限公司	五类	(2024) 新兽药证字46号	3年
非洲猪瘟病毒荧光重组酶介导扩增核酸检测试剂盒	中国动物卫生与流行病学中心、江苏奇天基因生物科技有限公司、青岛立见生物科技有限公司	三类	(2024) 新兽药证字47号	3年
牛口蹄疫病毒O型结构蛋白间接ELISA抗体检测试剂盒	中牧实业股份有限公司	/	/	/

附件2

兽药变更注册目录

兽药名称	申请单位	兽药标准来源	变更事项	监测期 (针对变更事项)
猫泛白细胞减少症病毒胶体金检测试纸条	洛阳普泰生物技术有限公司、北京市动物疫病预防控制中心、北京天恩泰生物科技有限公司	(2020) 新兽药证字 21号	对样品处理器的盛放容器进行变更	/
双葛止泻口服液	洛阳惠中兽药有限公司、普莱柯生物工程股份有限公司、河南新正好生物工程有限公司	(2019) 新兽药证字 48号	增加靶动物犊牛	3年
金霉素预混剂	驻马店华中正大有限公司	农业农村部公告 第246号同品种相应的内容	增加靶动物犊牛、绵羊羔羊	3年
莫能菌素预混剂	山东齐发药业有限公司	农业农村部公告 第246号同品种相应的内容	增加靶动物绵羊羔羊	3年

附件3(略)

附件4(略)

附件5

说明书和标签

一、米氮平软膏说明书和标签

(一)米氮平软膏说明书

宠物用 外用

【兽药名称】

通用名称:米氮平软膏

商品名称:

英文名称: Mirtazapine Ointment

汉语拼音: Midanping Ruangao

【主要成分】米氮平

【性状】本品为白色或类白色软膏。

【药理作用】米氮平是一种 α_2 -肾上腺素能受体拮抗剂和5-羟色胺(5-HT)能抗抑郁药。米氮平

是中枢神经系统中5-HT₂和5-HT₃受体的有效拮抗剂,也是组胺H₁受体的有效抑制剂。由于米氮平阻断5-HT₂和5-HT₃受体,只有5-HT_{1A}介导的5-羟色胺能传递增强。米氮平导致体重增加的确切机制尚未明确阐明,但似乎是多因素导致的结果。抑制5-HT₂受体可能是米氮平促进食欲作用的原因。米氮平诱导体重增加的另一个原因可能是和瘦素蛋白因子和肿瘤坏死因子 α (TNF- α)系统变化有关。

【适应证】 用于控制猫体重减轻。

【用法与用量】 以米氮平计。外用: 涂抹于内耳廓, 猫2mg (5g:100mg规格, 相当于本品长度3.8cm; 1g:20mg规格, 相当于本品0.1ml), 每日一次, 连用14日, 交替在左右耳廓内侧使用。(5g:100mg具体软膏长度参考以下图例:)

【不良反应】 1.用药部位反应(红斑、结痂、药物残留、脱屑、干燥、皮炎或刺激、脱毛和瘙痒等)和行为改变(叫声增强、多动、定向障碍或共济失调、嗜睡/虚弱、寻求关注和攻击行为等)在安全性和临床研究中非常常见。

2.呕吐、尿比重降低相关的多尿、血尿素氮(BUN)升高和脱水在安全性和临床研究中很常见。根据呕吐、脱水或行为改变的严重程度,可根据兽医的获益风险评估停止给药。

3.不良反应包括局部反应,在治疗结束时无需特殊治疗即可恢复。

4.在极少数情况下,可能发生超敏反应。在这种情况下,应立即停止治疗。

【禁忌症】 1.不得用于育种猫、怀孕或哺乳期的猫。

2.不得用于6月龄以下或体重低于2kg的猫。

3.不得用于对米氮平或任何辅料过敏的猫。

4.由于可能会增加5-羟色胺综合征的风险,本品不得与赛庚啶、曲马多或单胺氧化酶抑制剂(MAOI)联合用药,或在治疗前后14日内使用单胺氧化酶抑制剂(如盐酸司来吉兰、双甲脒)。

【注意事项】 1.本品不得经口或眼睛给药。

2.本品不得涂抹在破损皮肤上。

3.本品对患有严重肾脏疾病和/或肿瘤的猫的有效性和安全性尚未确定。

4.本品可能引起血清肝酶水平升高,患有肝病的猫慎用;肾脏疾病可能导致米氮平清除率降低,这可能导致更高的药物暴露,患有肾脏疾病的猫慎用。在这些特殊情况下如需使用本品,治疗过程中应定期检测肝、肾功能生化参数。

5.米氮平对血糖调节的作用尚未得到评价。在用于患有糖尿病的猫时,应定期监测血糖。

6.当用于低血容量的猫时,应实施支持性治疗(液体疗法)。

7.当前研究仅证实了本品推荐的14日给药方案的疗效。没有对重复治疗进行研究,因此只有在兽医进行利益风险评估后才能进行重复治疗。

8.本品的应用不能取代对引起体重减轻的潜在疾病的必要诊断和/或治疗方案。

9.停药后,需重点监测猫的食物摄入量。如果几天内进食量显著减少(大于75%),或猫停止进食超

过48小时,需经兽医重新评估。

10.治疗期间如错过一次给药,第二日继续按照每日剂量给药或遵医嘱。

11.本品是皮肤致敏剂,已知对米氮平过敏的人不得接触本品。

12.关于米氮平生殖毒性的研究数据有限。鉴于孕妇被认为是较为敏感人群,建议孕妇或备孕女性在整个治疗期避免接触本品,并避免与治疗后的动物接触。

13.避免直接接触本品。在每天用药后的12小时内,避免与治疗过的动物接触,直到用药部位干燥。在整个治疗期间,不允许治疗过的动物与主人睡觉,尤其是儿童和孕妇。用药部位干燥前,其他动物避免与用药动物接触。

14.本品可通过皮肤或口服吸收,引起嗜睡或镇静。在操作或使用本品时必须佩戴一次性防护手套,防止意外的局部暴露。使用后,丢弃手套,并用肥皂及清水洗手。

15.本品置于儿童无法触及处。给猫用药时,儿童不得在场。

16.操作本品时不得进食、饮水和吸烟。

17.本品可能产生眼部和皮肤刺激,在手彻底洗净前避免接触嘴和眼睛。如接触到眼睛,用清水彻底冲洗;如接触到皮肤,用肥皂和温水彻底清洗。如出现皮肤或眼部刺激,或不慎误食,应立即就医,并向医生出示本品说明书或标签。

【休药期】 无需制定。

【规格】 (1) 1g: 20mg (2) 5g: 100mg

【包装】

【贮藏】 25℃以下,密闭保存。

【有效期】 36个月;开启后30日。

【批准文号】

【生产企业】

(二)米氮平软膏标签

宠物用 外用

【兽药名称】

通用名称:米氮平软膏

商品名称:

英文名称: Mirtazapine Ointment

汉语拼音: Midanping Ruangao

【主要成分】 米氮平

【性状】 本品为白色或类白色软膏。

【药理作用】 详见说明书

【适应证】 用于控制猫体重减轻。

【用法与用量】 以米氮平计。外用:涂抹于内耳廓,猫2mg(5g:100mg规格,相当于本品长度3.8cm;1g:20mg规格,相当于本品0.1ml),每日一次,连用14日,交替在左右耳廓内侧使用。(5g:100mg具体软膏长度参考以下图例:)

【不良反应】 详见说明书

【注意事项】 详见说明书

【规格】 (1) 1g:20mg (2) 5g:100mg

【批准文号】

【生产日期】

【生产批号】

【有效期】 至

【休药期】 无需制定。

【包装】

【贮藏】 25℃以下, 密闭保存。

【生产企业】

二、非洲猪瘟病毒荧光重组酶介导扩增核酸检测试剂盒说明书和标签

(一) 非洲猪瘟病毒荧光重组酶介导扩增核酸检测试剂盒说明书

兽用

【兽药名称】

通用名 非洲猪瘟病毒荧光重组酶介导扩增核酸检测试剂盒

商品名

英文名 African Swine Fever Virus Real-time RAA Nucleic Acid Test Kit

汉语拼音 Feizhouzhuwenbingdu Yingguang Chongzumei Jiedao Kuozeng Hesuan Jiance shijihe

【主要成分与含量】

组份	规格
反应预混液	1500 μl/管×1管
乙酸镁	150 μl/管×1管
阳性对照	50 μl/管×1管
阴性对照	200 μl/管×1管
荧光反应单元	8测试/袋×3袋

【作用与用途】用于全血、血清、淋巴结、脾脏、肾脏、扁桃体、肺脏、环境样品等样本中非洲猪瘟病毒核酸的检测。

【用法与判定】

1 用法

1.1 样品采集及处理

1.1.1 活猪样品 无菌采集抗凝血或血清5ml。

1.1.2 病死猪剖检样品或屠宰场剖检样品无菌采集死猪的脾脏、肾脏、肺脏、扁桃体、淋巴结等组织样品。2~8℃低温运至实验室用于检测。

1.1.3 病猪污染的周边环境采集与病猪相关场所的粪便、污水等样品。2~8℃低温运至实验室用于检测。

1.1.4 样品存放采集或处理好的样品在2℃~8℃条件下保存应不超过24h；若需长期保存，须放置-70℃冰箱，但应避免反复冻融（冻融不超过3次）。

1.2 样品处理方法

1.2.1 脾脏、肺脏、肾脏、扁桃体、淋巴结等组织样品处理方法 用无菌的剪刀和镊子剪取待检样品0.2g于研磨管中再加2.0 ml PBS缓冲液混匀研磨，6000 r/min震荡研磨45s，制成约10%的组织匀浆液，对处理的待检样品置70℃，30 min灭活，5000r/min离心5min，取200 μ l上清液进行核酸提取。

1.2.2 全血、血清等样品处理方法 直接取200 μ l样品进行核酸提取。

1.2.3 粪便样品处理方法 取适量的粪便放入盛有PBS缓冲液的研磨管中，6000r/min震荡研磨45s，制成约10%的匀浆液，对处理的待检样品置70℃，30min灭活，5000r/min离心5min，取200 μ l上清液进行核酸提取。

1.2.4 污水样品处理方法 直接取200 μ l污水进行核酸提取。

1.3 样品核酸提取 采用DNA提取试剂盒或自动核酸提取仪提取各类样品中的核酸，具体提取方法请按相应说明书执行。提取出来的各类样品中的核酸，-20℃低温保存待检，长期保存应在-70℃保存（反复冻融不超过3次）

1.4 荧光RAA扩增检测

1.4.1 开启荧光基因检测仪，温度调节至39℃，进行预热，反应时间设置15 min。

1.4.2 从试剂盒中取出反应预混液，乙酸镁，室温融化。取荧光反应单元管数为n（n =样本数+1管阴性对照+1管阳性对照），在每个荧光反应单元管上做好标记。

1.4.3 向每个荧光反应单元中加入45.5 μ l反应预混液，再向每个荧光反应单元管盖上加2.5 μ l乙酸镁。

1.4.4 向上述荧光反应单元中分别加入2 μ l阴性对照、2 μ l提取的样本核酸DNA、2 μ l阳性对照。（加样顺序是阴性对照、待检样本、阳性对照，每加完一个样盖好管盖）。

1.4.5 将上述1.4.4试剂充分混匀；或者放入恒温振荡混匀仪，一键完成混匀收集。

1.4.6 将混匀的荧光反应单元放入荧光基因检测仪中，反应温度39℃，反应时间15min，并实时观察结果。

2 判定

2.1 试验成立条件 阳性对照起峰时间TT值应 $\leq$ 1.67min且出现特异性反应曲线，阴性对照应无起峰时间TT值或TT值 $>$ 10min且无特异性反应曲线，试验结果有效，否则应重新进行试验。

2.2 结果判定

2.2.1 阴性判定 在试验成立的条件下,被检样品无起峰时间TT值或TT值 >10 min且无特异性反应曲线,则判定为非洲猪瘟病毒核酸阴性。

2.2.2 阳性判定 在试验成立的条件下,被检样品起峰时间TT值 ≤ 10 min且出现特异性反应曲线,则判定为非洲猪瘟病毒核酸阳性。

【注意事项】(1) 实验室应至少分三个区:样品处理区、加样区和检测区。

(2) 各区物品均为专用,不得交叉使用,避免污染。检测结束后,应立即对工作台进行清洁。

(3) 在整个检测过程中应注意避免交叉污染:提取核酸时应用灭菌的镊子夹取离心管;对离心管开盖时应避免粘在手上或溅出,否则要立即更换手套。

(4) 反应预混液、乙酸镁在使用前要彻底融化,分装反应液时,应尽量避免产生气泡。上机前注意检查各反应管是否盖紧,以免荧光物质泄漏污染仪器。

(5) 不能使用过有效期的产品。

(6) 试剂盒中各组分应避免反复冻融。

(7) 对样品及其废弃物的操作应严格遵守生物安全规定。

(8) 本试剂盒仅供兽医及相关专业人士使用。

【规格】24测试/盒

【贮藏与有效期】-20℃以下避光保存,有效期为12个月。

【批准文号】

【生产企业】

仅供兽医诊断使用

(二) 非洲猪瘟病毒荧光重组酶介导扩增核酸检测试剂盒标签

非洲猪瘟病毒荧光重组酶介导扩增核酸检测试剂盒

兽用

24次/盒

批准文号:

批 号:

有效期至:

【用法与判定】详见说明书。

【贮藏与有效期】-20℃以下保存,有效期为12个月。

【生产企业】

仅供兽医诊断使用

荧光反应单元

兽用

8测试/袋

批 号:

有效期至:

【用法与判定】详见说明书。

【贮藏与有效期】-20℃以下保存, 有效期为12个月。

【生产企业】

仅供兽医诊断使用

反应预混液

1500 μl/管

批 号:

有效期至:

兽用

【用法与判定】详见说明书。

【贮藏与有效期】-20℃以下保存, 有效期为12个月。

【生产企业】

仅供兽医诊断使用

乙酸镁

150 μl/管

批 号:

有效期至:

兽用

【用法与判定】详见说明书。

【贮藏与有效期】-20℃以下保存, 有效期为12个月。

【生产企业】

仅供兽医诊断使用

阳性对照

50 μl/管

批 号:

有效期至:

兽用

【用法与判定】详见说明书。

【贮藏与有效期】-20℃以下保存, 有效期为12个月。

【生产企业】

仅供兽医诊断使用

阴性对照

兽用

200 μ l/管

批 号:

有效期至:

【用法与判定】详见说明书。

【贮藏与有效期】-20℃以下保存,有效期为12个月。

【生产企业】

仅供兽医诊断使用

三、牛口蹄疫病毒O型结构蛋白间接ELISA抗体检测试剂盒说明书和标签

(一)牛口蹄疫病毒O型结构蛋白间接ELISA抗体检测试剂盒说明书

兽用

【兽药名称】

通用名 牛口蹄疫病毒O型结构蛋白间接ELISA抗体检测试剂盒

商品名 无

英文名 Indirect ELISA Kit for Detection of Antibodies Against Bovine FMDV Type O Structural Protein

汉语拼音 Niu Koutiyi Bingdu O Xing Jiegoudanbai Jianjie ELISA Kangti Jiance Shijihe

【主要成分与含量】

(1) 抗原包被板	2块(96孔/块)
(2) 阳性对照血清	1管(1.5ml/管)
(3) 阴性对照血清	1管(1.5ml/管)
(4) 羊抗牛酶标二抗	2瓶(12ml/瓶)
(5) 样品稀释液	1瓶(24ml/瓶)
(6) 20倍浓缩洗涤液	2瓶(50ml/瓶)
(7) 底物液A	1瓶(12ml/瓶)
(8) 底物液B	1瓶(12ml/瓶)
(9) 终止液	1瓶(12ml/瓶)
(10) 血清稀释板	2块(96孔/块)
(11) 说明书	1份

【作用与用途】用于检测牛血清中口蹄疫病毒O型结构蛋白抗体。

【用法与判定】

1 用法

1.1 样品制备 取动物全血,待血液凝固后,以3500r/min离心10分钟,收集上清,也可采集血液,待凝固后自然析出血清,要求血清清亮,无溶血。

1.2 洗涤液配制 使用前,将20倍浓缩洗涤液恢复至室温,如果有沉淀,37℃水浴使其溶解,然后用去离子水稀释20倍备用。

1.3 样品稀释 在血清稀释板中按1:20的比例稀释待检血清, 阴性及阳性对照血清已稀释, 可直接使用。

1.4 操作步骤

1.4.1 加样 取抗原包被板, 将稀释好的待检血清、阳性对照和阴性对照加入到抗原包被板中, 100 μ l/孔。每份待检血清设1孔, 阳性对照和阴性对照各设2孔, 加样过程时间跨度应尽量短。酶标板上对照和待检血清添加模式如下所示。

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	S1											
B	S2											
C	S3											
D	S4											
E	...											P
F												P
G												N
H												N

注: S1、S2、S3、S4: 表示加各待检血清; P: 表示加阳性对照血清; N: 表示加阴性对照血清。

1.4.2 温育 振荡混匀(勿溢出), 置37℃温箱内孵育30分钟。

1.4.3 洗板 弃去反应液, 每孔加入洗涤液300 μ l, 连续洗板5次后拍干。

1.4.4 加酶 各孔加入羊抗牛酶标二抗100 μ l。

1.4.5 温育 置37℃温箱内孵育30分钟。

1.4.6 洗板 弃去反应液, 每孔加入洗涤液300 μ l, 甩弃洗涤液。连续洗板5次后拍干。

1.4.7 显色 各孔加入100 μ l底物工作液(将底物液A和底物液B等量混合即为底物工作液, 现用现配), 振荡混匀, 置37℃温箱内避光反应15分钟。

1.4.8 终止 各孔加入显色终止液50 μ l, 振荡混匀终止反应, 15分钟内测定结果。

2 判定 在酶标仪上测各孔OD_{450nm}值。

2.1 试验成立的条件是: 阳性对照孔OD_{450nm}值应介于1.0~2.0之间, 阴性对照孔OD_{450nm}值均应 $\leq$ 0.15;

2.2 临界值(Cut-off值)=阳性对照孔OD_{450nm}均值 $\times$ 0.17;

2.3 待检血清测定OD_{450nm}值 $\geq$ 临界值者判为阳性; 待检血清测定OD_{450nm}值 $<$ 临界值者判为阴性。

【注意事项】(1) 将试剂盒从冷藏环境中取出, 置室温平衡30分钟后使用, 液体试剂用前混匀。洗涤液若有结晶析出, 轻微加热溶解后不影响使用。为保证检测结果的准确性, 操作环境温度控制在20 $\pm$ 5℃。

(2) 不同厂家、不同批号、不同品种试剂不能混用。

(3) 严格按说明书操作, 并控制反应温度及反应时间。反应液需用微量移液器加注, 微量移液器应定期校准。

(4) 若包被板开封后不能一次用完, 应将剩余板条和干燥剂放入塑封袋内封好, 置2~8℃并限一周

内用完。

(5) 所有待检血清、废液、阴阳性对照血清等均按传染性污染物处理, 121℃高压蒸汽灭菌30分钟或用5g/L次氯酸钠消毒剂处理30分钟后废弃。

(6) 待检血清要求 待检血清按常规方法采集, 避免溶血或长菌。冰冻待检血清应避免反复冻融, 出现混浊或沉淀应离心或过滤澄清后再检测。

【规格】 96孔/块, 2块/盒

【贮藏与有效期】 2~8℃保存, 有效期为9个月。

【批准文号】

【生产企业】

仅供兽医诊断使用

(二) 牛口蹄疫病毒O型结构蛋白间接ELISA抗体检测试剂盒标签

兽用

牛口蹄疫病毒O型结构蛋白间接ELISA抗体检测试剂盒

96孔/块, 2块/盒

批准文号:

批 号:

有效期至:

【用法与判定】 详见说明书

【贮藏与有效期】 2~8℃保存, 有效期为9个月。

【生产企业】

仅供兽医诊断使用

抗原包被板

96孔/块

批 号:

有效期至:

【用法与判定】 详见说明书

【贮藏与有效期】 2~8℃保存, 有效期为9个月。

【生产企业】

仅供兽医诊断使用

阳性对照血清

1.5ml/管

批 号:

有效期至:

【用法与判定】 详见说明书

【贮藏与有效期】 2~8℃保存, 有效期为9个月。

兽用

【生产企业】

仅供兽医诊断使用

阴性对照血清

兽用

1.5ml/管

批 号：
有效期至：

【用法与判定】 详见说明书

【贮藏与有效期】 2~8℃保存, 有效期为9个月。

【生产企业】

仅供兽医诊断使用

羊抗牛酶标二抗

兽用

12ml/瓶

批 号：
有效期至：

【用法与判定】 详见说明书

【贮藏与有效期】 2~8℃保存, 有效期为9个月。

【生产企业】

仅供兽医诊断使用

样品稀释液

兽用

24ml/瓶

批 号：
有效期至：

【用法与判定】 详见说明书

【贮藏与有效期】 2~8℃保存, 有效期为9个月。

【生产企业】

仅供兽医诊断使用

20倍浓缩洗涤液

兽用

50ml/瓶

批 号：
有效期至：

【用法与判定】 详见说明书

【贮藏与有效期】 2~8℃保存, 有效期为9个月。

【生产企业】

仅供兽医诊断使用

底物液A

12ml/瓶

批 号:

有效期至:

兽用

【用法与判定】 详见说明书

【贮藏与有效期】 2~8℃保存, 有效期为9个月。

【生产企业】

仅供兽医诊断使用

底物液B

12ml/瓶

批 号:

有效期至:

兽用

【用法与判定】 详见说明书

【贮藏与有效期】 2~8℃保存, 有效期为9个月。

【生产企业】

仅供兽医诊断使用

终止液

12ml/瓶

批 号:

有效期至:

兽用

【用法与判定】 详见说明书

【贮藏与有效期】 2~8℃保存, 有效期为9个月。

【生产企业】

仅供兽医诊断使用

血清稀释板

96孔/块

批 号:

有效期至:

兽用

【用法与判定】 详见说明书

【贮藏与有效期】 2~8℃保存, 有效期为9个月。

【生产企业】

仅供兽医诊断使用

四、猫泛白细胞减少症病毒胶体金检测试纸条说明书和标签

(一) 猫泛白细胞减少症病毒胶体金检测试纸条说明书

兽用

【兽药名称】

通用名 猫泛白细胞减少症病毒胶体金检测试纸条

商品名 无

英文名 Feline Panleukopenia Virus Colloidal Gold Test Strips

汉语拼音 Maofanbaixibaojianshaozhengbingdu Jiaotijin Jianceshizhitiao

【主要成分与含量】

组分	规格与数量		
	10条/盒	20条/盒	50条/盒
猫泛白细胞减少症病毒胶体金检测试纸条	10条	20条	50条
样品处理液	10管(1ml/管)	20管(1ml/管)	50管(1ml/管)
样品采集棉拭子	10个	20个	50个
说明书	1份	1份	1份

【性状】试纸条 铝箔袋密封良好,每袋内附1条试纸条、1包干燥剂和1个一次性滴管。其中,试纸条外表无瑕疵,无划痕,上下底片咬合紧密,无歪曲变形,检测窗口位置适中,且C、T标示清晰;一次性滴管完好无损。

样品处理液 无色澄清液体。

样品采集棉拭子 外观无破损,无裂缝。

【作用与用途】用于检测猫肛拭子、粪便及病毒培养物等样品中的猫泛白细胞减少症病毒抗原。

【用法与判定】

1 样品采集及处理

1.1 猫肛拭子 用样品采集棉拭子采集待检猫肛拭子,将其插入样品处理液中,紧靠管内壁旋转多次使样品充分溶解,取上清待检。

1.2 猫粪便 用样品采集棉拭子采集待检猫粪便(约0.1g),将其插入样品处理液中,紧靠管内壁旋转多次使样品充分溶解,取上清待检。

1.3 病毒培养物等液体样品 将液体样品与样品处理液按1:1体积混合均匀,待检。

2 操作步骤 取出试纸条,水平放置,用一次性滴管吸取处理好的样品,垂直滴加4滴(约100 μ l)到试纸条的加样孔中,10分钟内判定结果。

3 结果判定 对照线、检测线均显色,判为阳性;仅对照线显色,判为阴性;对照线不显色,判为无效结果。

【注意事项】(1) 本品仅用于兽医诊断使用，操作应按说明书严格进行。请勿使用过期、损坏的产品，各个组分不能重复使用或不同试剂盒混用。

(2) 本品在2~30℃干燥的环境保存，在室温条件下进行试验，撕开铝箔袋取出试纸条后应立即使用，防止试纸条受潮。

(3) 不要使用放置时间过长、长菌的样品，以避免因样品污染而造成的非特异反应。

(4) 所用样品、废液和废弃物均应按传染物处理，注意操作的生物安全性。铝箔袋内干燥剂不可内服。

【规格】(1) 10条/盒 (2) 20条/盒 (3) 50条/盒

【贮藏与有效期】2~30℃保存，有效期为24个月。

【批准文号】

【生产企业】

仅供兽医诊断使用

(二) 猫泛白细胞减少症病毒胶体金检测试纸条标签

兽用

猫泛白细胞减少症病毒胶体金检测试纸条

1条/袋

批 号:

有效期至:

【用法与判定】详见说明书。

【贮藏与有效期】2~30℃保存，有效期为24个月。

【生产企业】

仅供兽医诊断使用

兽用

样品处理液

10管(1ml/管)

批 号:

有效期至:

【用法与判定】详见说明书。

【贮藏与有效期】2~30℃保存,有效期为24个月。

【生产企业】

仅供兽医诊断使用

五、双葛止泻口服液说明书和标签

(一)双葛止泻口服液说明书

兽用

【兽药名称】

通用名称:双葛止泻口服液

商品名称:

汉语拼音: Shuangge Zhixie Koufuye

【主要成分】金银花、葛根、黄芩、黄连、白芍、炙甘草。

【性状】本品为棕红色至棕褐色液体。

【功能与主治】清热燥湿,解毒止泻。主治犍牛湿热泄泻,证见排便频繁、粪便黏腻、腥臭、赤白相间或挟有血丝,病牛精神沉郁、食欲减退、鼻镜干燥等;仔猪湿热泄泻,证见黄色糊状或稀粥样粪便、或挟有黏液,鼻盘微干等;鸡湿热泄泻,证见精神沉郁、排黄白色或黄绿色稀便。

【用法与用量】灌服:每1kg体重,犍牛0.4ml,一日1次,连用5日;灌服:一次量,每1kg体重,仔猪0.34ml,一日2次,连用5日;混饮:每1kg体重,鸡0.5ml,将药物加入全天饮水量10%~20%的水中,供鸡集中饮用,一日1次,连用5日。

【不良反应】暂未发现不良反应。

【注意事项】暂无规定。

【规格】每1ml相当于原生药0.45g。

【包装】250ml/瓶

【贮藏】密封,置阴凉处。

【有效期】24个月

【批准文号】

【生产企业】

(二)双葛止泻口服液标签

兽用

【兽药名称】

通用名称: 双葛止泻口服液

商品名称:

汉语拼音: Shuangge Zhixie Koufuye

【主要成分】 金银花、葛根、黄芩、黄连、白芍、炙甘草。**【性状】** 本品为棕红色至棕褐色液体。**【功能与主治】** 清热燥湿, 解毒止泻。主治犊牛湿热泄泻, 证见排便频繁、粪便黏腻、腥臭、赤白相间或挟有血丝, 病牛精神沉郁、食欲减退、鼻镜干燥等; 仔猪湿热泄泻, 证见黄色糊状或稀粥样粪便、或挟有黏液, 鼻盘微干等; 鸡湿热泄泻, 证见精神沉郁、排黄白色或黄绿色稀便。**【用法与用量】** 灌服: 每1kg体重, 犊牛0.4ml, 一日1次, 连用5日; 灌服: 一次量, 每1kg体重, 仔猪0.34ml, 一日2次, 连用5日; 混饮: 每1kg体重, 鸡0.5ml, 将药物加入全天饮水量10%~20%的水中, 供鸡集中饮用, 一日1次, 连用5日。**【规格】** 每1ml相当于原生药0.45g。**【批准文号】****【生产日期】****【生产批号】****【有效期】** 至**【包装】** 250ml/瓶**【贮藏】** 密封, 置阴凉处。**【生产企业】**

六、金霉素预混剂说明书和标签

(一) 金霉素预混剂说明书

兽用处方药

【兽药名称】

通用名称: 金霉素预混剂

商品名称:

英文名称: Chlortetracycline Premix

汉语拼音: Jinmeisu Yuhunji

【主要成分】 金霉素**【性状】** 本品为棕色或棕褐色粉末或颗粒, 无结块发霉, 无臭。**【药理作用】** 金霉素属于四环素类广谱抗生素, 对葡萄球菌、溶血性链球菌、炭疽杆菌、破伤风梭菌和梭状芽孢杆菌等革兰氏阳性菌作用较强, 但不如 β -内酰胺类。对大肠埃希菌、沙门氏菌、布鲁氏菌和巴氏杆菌等革兰氏阴性菌较敏感, 但不如氨基糖苷类和酰胺醇类抗生素。本品对立克次体、衣原体、支原体、螺旋体、放线菌和某些原虫也有抑制作用。**【药物相互作用】** 金霉素能与镁、钙、铝、铁、锌、锰等多价金属离子形成难溶性的络合物, 从而影响

药物的吸收。因此，它不宜与含上述多价金属离子的药物、饲料及乳制品共服。

【适应证】 用于治疗10~30日龄犊牛大肠埃希菌性腹泻；用于治疗40日龄左右绵羊羔羊大肠埃希菌性腹泻；用于治疗断奶仔猪腹泻；治疗猪气喘病、增生性肠炎等。

【用法与用量】 以金霉素计。混饲：按1:1拌入开口料中，每1kg体重，10~30日龄犊牛22mg，一日一次，连用5日；拌入日采食量10%的开口料中，每1kg体重，40日龄左右绵羊羔羊25mg。一日一次，连用5日；每1000kg饲料，猪400~600g，连用7日。

【不良反应】 按规定的用法与用量使用尚未见不良反应。

【注意事项】 在猪丹毒疫苗接种前2日和接种后10日内，不得使用金霉素。

【休药期】 牛10日，羊10日，猪7日。

【规格】 按金霉素计算 (1)1000g:100g(1亿单位) (2)1000g:150g(1.5亿单位) (3)1000g:200g(2亿单位) (4)1000g:250g(2.5亿单位) (5)1000g:300g(3亿单位)

【包装】

【贮藏】 遮光，密封，在干燥处保存。

【有效期】 18个月。

【批准文号】

【生产企业】

(二) 金霉素预混剂标签

兽用处方药

【兽药名称】

通用名称: 金霉素预混剂

商品名称:

英文名称: Chlortetracycline Premix

汉语拼音: Jinmeisu Yuhunji

【主要成分】 金霉素

【性状】 本品为棕色或棕褐色粉末或颗粒，无结块发霉，无臭。

【适应证】 用于治疗10~30日龄犊牛大肠埃希菌性腹泻；用于治疗40日龄左右绵羊羔羊大肠埃希菌性腹泻；用于治疗断奶仔猪腹泻；治疗猪气喘病、增生性肠炎等。

【用法与用量】 以金霉素计。混饲：按1:1拌入开口料中，每1kg体重，10~30日龄犊牛22mg，一日一次，连用5日；拌入日采食量10%的开口料中，每1kg体重，40日龄左右绵羊羔羊25mg，一日一次，连用5日；每1000kg饲料，猪400~600g，连用7日。

【规格】 按金霉素计算 (1)1000g:100g(1亿单位) (2)1000g:150g(1.5亿单位) (3)1000g:200g(2亿单位) (4)1000g:250g(2.5亿单位) (5)1000g:300g(3亿单位)

【批准文号】

【生产日期】

【生产批号】

【有效期】 至

【**休药期**】牛10日,羊10日,猪7日。

【**包装**】

【**贮藏**】遮光,密封,在干燥处保存。

【**生产企业**】

七、莫能菌素预混剂说明书和标签

(一)莫能菌素预混剂说明书

兽用非处方药

【**兽药名称**】

通用名称:莫能菌素预混剂

商品名称:莫球(Anticoco)

英文名称:Monensin Premix

汉语拼音:Monengjunsu Yuhunji

【**主要成分**】莫能菌素

【**性状**】灰白色或灰褐色颗粒

【**药理作用**】本品为单价离子载体类广谱抗球虫药。对牛的牛艾美耳球虫、邱氏艾美耳球虫等有效。

对绵羊的小型艾美耳球虫、类绵羊艾美耳球虫、错乱艾美耳球虫等有效。对鸡的毒害、柔嫩、巨型、变位、堆型、布氏艾美耳球虫等均有很好的杀灭效果。对火鸡腺艾美耳球虫和火鸡艾美耳球虫、鹌鹑的分散和莱泰艾美耳球虫、羔羊雅氏、阿撒地艾美耳球虫亦有效。

莫能菌素的作用峰期是在球虫生活周期的最初2天,对孢子及第一代裂殖体都有抑制作用。其杀球虫作用机理是通过干扰球虫细胞内 K^+ 、 Na^+ 的正常渗透,使大量的 Na^+ 和水分进入细胞内,引起肿胀而死亡。

【**适应证**】用于控制犊牛、绵羊羔羊的球虫病,预防鸡球虫病。

【**用法与用量**】以莫能菌素计。混饲:用于控制犊牛球虫病,每日莫能菌素摄入量为0.62mg/kg体重,连用28日。混饲:用于控制绵羊羔羊球虫病,每1000kg饲料,绵羊羔羊20g,连用28日。混饲:用于预防鸡球虫病,每1000kg饲料,鸡90~110g。

【**不良反应**】饲料中添加量超过120mg/kg(以莫能菌素计)时,可引起鸡增长率和饲料转化率下降。

【**注意事项**】

- 1.本品用于控制犊牛、绵羊羔羊的球虫病、预防鸡球虫病时可在商品饲料和养殖过程中使用。
- 2.饲喂前必须将莫能菌素与饲料混匀,禁止直接饲喂未经稀释的莫能菌素。
- 3.10周龄以上火鸡、珍珠鸡及鸟类对本品较敏感,不宜应用;超过16周龄的鸡禁用。产蛋供人食用的鸡,在产蛋期不得使用。
- 4.不得用于泌乳期奶牛。
- 5.禁止与泰妙菌素、竹桃霉素同时使用,以免发生中毒。
- 6.马属动物禁用。

7.搅拌配料时防止与人的皮肤、眼睛接触。

8.请严格按照用法与用量使用。本品的安全性试验显示,饲料中莫能菌素添加量为100mg/kg时,可能会导致羊肺脏组织出现异常病理变化。

【休药期】 犊牛0日,羊0日,鸡5日。

【规格】 (1)100g:20g(2000万单位) (2)100g:40g(4000万单位)

【包装】

【贮藏】 密闭,在干燥处保存。

【有效期】 24个月

【批准文号】

【生产企业】

(二)莫能菌素预混剂标签

兽用非处方药

【兽药名称】

通用名称:莫能菌素预混剂

商品名称:莫球(Anticoco)

英文名称:Monensin Premix

汉语拼音:Monengjunsu Yuhunji

【主要成分】 莫能菌素

【性状】 灰白色或灰褐色颗粒

【适应证】 用于控制犊牛、绵羊羔羊的球虫病,预防鸡球虫病。

【用法与用量】 以莫能菌素计。混饲:用于控制犊牛球虫病,每日莫能菌素摄入量为0.62mg/kg体重,连用28日。混饲:用于控制绵羊羔羊球虫病,每1000kg饲料,绵羊羔羊20g,连用28日。混饲:用于预防鸡球虫病,每1000kg饲料,鸡90~110g。

【休药期】 犊牛0日,羊0日,鸡5日。

【规格】 (1)100g:20g(2000万单位) (2)100g:40g(4000万单位)

【包装】

【贮藏】 密闭,在干燥处保存。

【批准文号】

【生产日期】

【生产批号】

【有效期】 至

【生产企业】

附件6(略)

中华人民共和国农业农村部公告

第 825 号

根据《农药管理条例》《农药登记试验管理办法》《农药登记试验单位评审规则》等有关规定,认定中国疾病预防控制中心传染病预防控制所等7家单位为农药登记试验单位,具体试验范围和有效期见附件。

特此公告。

附件: 认定农药登记试验单位及试验范围

农业农村部
2024年9月11日

附件

认定农药登记试验单位及试验范围

序号	单位名称	试验范围	有效期	证书编号
1	中国疾病预防控制中心 传染病预防控制所	药效试验: 卫生用农药试验 (卫生杀虫剂、杀鼠剂)	2024年9月11日 至2029年9月10日	SD2024093
2	吉林省农业科学院(中国农业科技东 北创新中心)植物保护研究所	药效试验: 农林用农药试验 (杀虫剂、杀菌剂、除草剂、植物生长调节剂)	2024年9月11日 至2029年9月10日	SD2024189
3	山东省农业科学院 农业质量标准与检测技术研究所	残留试验: 农作物残留试验(室内检测、田间试验)、 加工农产品残留试验(油料)	2024年9月11日 至2029年9月10日	SD2024100
4	湖南容成农业科技有限公司	残留试验: 农作物残留试验(田间试验)	2024年9月11日 至2029年9月10日	SD2024099
5	广州禾益农业技术有限公司	药效试验: 农林用农药试验 (杀虫剂、杀菌剂、除草剂、植物生长调节剂)	2024年9月11日 至2029年9月10日	SD2024098
6	海南特谱农业科技有限公司	药效试验: 农林用农药试验(杀虫剂、除草剂) 残留试验: 农作物残留试验(室内检测、田间试验)	2024年9月11日 至2029年9月10日	SD2024092
7	昆明慧佑农业科技有限责任公司	药效试验: 农林用农药试验(杀菌剂)	2024年9月11日 至2029年9月10日	SD2024095

中华人民共和国农业农村部公告

第 826 号

“隆两优1813”等水稻、玉米、马铃薯、普通小麦、大豆、甘蓝型油菜、花生、甘薯、谷子、高粱、大麦属、棉属、桑属、橡胶树、茶组、芝麻、木薯、燕麦、向日葵、荞麦属、甜菜、大白菜、普通番茄、黄瓜、辣椒属、普通西瓜、普通结球甘蓝、食用萝卜、茄子、菜豆、豇豆、西葫芦、胡萝卜、甜瓜、不结球白菜、芥菜、莴苣、南瓜、青花菜、洋葱、山药(薯蓣)、菊属、石竹属、百合属、非洲菊、果子蔓属、蝴蝶兰属、秋海棠属、新几内亚凤仙花、萱草属、水仙属、石蒜属、天竺葵属、芍药组、梨属、桃、荔枝、苹果属、柑橘属、香蕉、猕猴桃属、葡萄属、草莓、枇杷、樱桃、芒果、紫花苜蓿、石斛属、甜菊(甜叶菊)、丹参、黄花蒿、砂仁、真姬菇共73个植物属种1950个品种,经审查,符合《植物新品种保护条例》和《植物新品种保护条例实施细则(农业部分)》的要求,现对其授予植物新品种权。

特此公告。

农业农村部
2024年9月18日

中华人民共和国农业农村部公告

第 827 号

根据《农药管理条例》《农药登记管理办法》等有关规定,经全国农药登记评审委员会评审,批准上海万力华生物科技有限公司等5家企业申请的7个新有效成分、12个新农药产品登记,核发《农药登记证》,核准产品标签。

特此公告。

- 附件: 1. 新农药产品登记信息
2. 经核准的新农药产品标签

农业农村部
2024年9月18日

附件1

新农药产品登记信息

序号	登记证持有人	农药名称	剂型	毒性	有效成分及含量	农药类别	作物/场所	防治对象	产品质量标准号	农药登记证号
1	上海万力华生物科技有限公司	多粘类芽孢杆菌P1	母药	微毒	多粘类芽孢杆菌P1 100亿CFU/克	杀菌剂			Q/0117000962C002-2024	PD20242638
			悬浮剂	微毒	多粘类芽孢杆菌P1 20亿CFU/毫升	杀菌剂	黄瓜	霜霉病	Q31/0117000962C001-2024	PD20242642
2	辽宁先达农业科学有限公司	吡唑啉草酯	原药	低毒	吡唑啉草酯 95%	除草剂			Q/LNXD 015-2024	PD20242639
			可分散油悬浮剂	低毒	吡唑啉草酯 5%	除草剂	水稻田(直播)	一年生禾本科杂草	Q/LNXD 016-2024	PD20242643
3	青岛清原农冠抗性杂草防治有限公司	氟砒草胺	原药	低毒	氟砒草胺 95%	除草剂			Q/370284QNG 049-2020	PD20242647
			可溶液剂	低毒	氟砒草胺 60克/升	除草剂	移栽水稻田 水稻田(直播)	一年生杂草 一年生杂草	Q/370284QNG 048-2020	PD20242648
		敌稗·氟砒草胺	微乳剂	低毒	氟砒草胺 30克/升, 敌稗 220克/升	除草剂	移栽水稻田	一年生杂草	Q/370284QNG 061-2020	PD20242649
							水稻田(直播)	一年生杂草		
4	山东清原农冠作物科学有限公司	氟草啶	原药	低毒	氟草啶 95%	除草剂			Q/370783SDQY 027-2023	PD20242640
		氟草啶	乳油	低毒	氟草啶 40克/升	除草剂	非耕地	杂草	Q/370783SDQY 020-2023	PD20242646
							滩涂	五花米草、芦苇等杂草		
		草铵膦·氟草啶	微乳剂	低毒	草铵膦 200克/升, 氟草啶 10克/升	除草剂	非耕地	杂草	Q/370783SDQY 022-2023	PD20242644
微乳剂	低毒		氟草啶 10克/升, 精草铵膦 100克/升	除草剂	非耕地 柑橘园	杂草 杂草	Q/370783SDQY 021-2023	PD20242645		
5	宁波纽康生物技术有限公司	玉米螟性诱剂	挥发芯	低毒	反-12-十四碳烯乙酸酯 0.06%, 十四醇乙酸酯 0.03%, 顺-12-十四碳烯乙酸酯 0.06%	杀虫剂	玉米	玉米螟	Q/NK 041-2024	PD20242641

附件2

经核准的新农药产品标签

登记证号: PD20242638

登记证持有人: 上海万力华生物科技有限公司

农药名称: 多粘类芽孢杆菌 P1

剂型: 母药

毒性及其标识: **微毒**

有效成分及其含量:

多粘类芽孢杆菌P1 100亿CFU/克

使用范围和使用方法:

作物/场所	防治对象	用药量(制剂量/亩)	施用方式
-------	------	------------	------

使用技术要求:

产品性能:

本品为微生物杀菌剂。作用机理是通过分泌胞外多糖、抗菌物质多粘菌素等以及诱导抗性等作用, 杀灭和抑制有害菌, 以达到防治病害的目的。本品是农药制剂加工的原材料, 不得用于农作物或者其他场所。

注意事项:

1.使用时注意安全防护, 穿戴防护服和手套、口罩等安全防护措施, 避免与皮肤和眼睛接触。使用后应及时清洗手脸等暴露部位皮肤并更换衣物。所有操作应在通风处进行。2.用过的容器应妥善处理, 不可做他用或随意丢弃。3.孕妇和哺乳期妇女禁止接触。

中毒急救措施:

使用时如有不适立即停止工作, 采用急救措施, 及时携标签送医院就诊。吸入, 立即转移到新鲜空气处; 误食, 立即用大量清水漱口并携标签就诊; 不慎接触皮肤, 用肥皂和大量清水冲洗; 不慎溅入眼睛, 提起眼睑, 用大量清水冲洗干净。

储存和运输方法:

1.本品应储存在阴凉、干燥、通风、防雨处, 不可倒置。远离火源、热源。2.本品应当置于儿童、无关人员及动物接触不到的地方, 并加锁保存。3.勿与食品、饮料、粮食、种子、饲料等同储同运。4.运输过程中要防晒、防雨淋; 装卸人员穿戴防护用具, 要轻搬轻放, 确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。

质量保证期: 1年

备注:

登记证号: PD20242642

登记证持有人: 上海万力华生物科技有限公司

农药名称: 多粘类芽孢杆菌 P1

剂型: 悬浮剂

毒性及其标识: **微毒**

有效成分及其含量:

多粘类芽孢杆菌P1 20亿CFU/毫升

使用范围和使用方法:

作物/场所	防治对象	用药量(制剂量/亩)	施用方式
黄瓜	霜霉病	400~600毫升/亩	喷雾

使用技术要求:

1.于黄瓜霜霉病发病前或发病初期进行常规喷雾施药, 可用药3次, 每次施药间隔期5~7天。2.施药应选在傍晚或早晨, 不宜在太阳暴晒下或雨前进行。若施药后24小时内遇大雨天气, 天晴后应补施一次。

产品性能:

本品为微生物杀菌剂。作用机理是通过分泌胞外多糖、抗菌物质多粘菌素等以及诱导抗性

作用, 杀灭和抑制有害菌, 以达到防治病害的目的。本品用于防治黄瓜霜霉病。

注意事项:

1. 本品对眼睛有刺激性。使用时注意安全防护, 穿戴防护服、护目镜、帽子、手套、口罩等安全防护措施, 避免与皮肤和眼睛接触。使用后应及时清洗手脸等暴露部位皮肤并更换衣物。所有操作应在通风处进行。2. 农药包装废弃物不得随意丢弃或自行处理, 及时交回农药经营者或农药包装废弃物回收站; 用过的容器应妥善处理, 不可作他用或随意丢弃。3. 孕妇和哺乳期妇女禁止接触。4. 禁止在河塘等水体中清洗施药器具, 施药后剩余药液不得随意倾倒。

中毒急救措施:

使用时如有不适应立即停止工作, 采用急救措施, 携标签送医院就诊。吸入, 立即转移到新鲜空气处; 误食, 立即用大量清水漱口并携标签就诊; 不慎接触皮肤, 用肥皂和大量清水冲洗; 不慎溅入眼睛, 提起眼睑, 用大量清水冲洗干净。

储存和运输方法:

1. 本品应储存在阴凉、干燥、通风、防雨处, 不可倒置。远离火源、热源。2. 本品应当置于儿童、无关人员及动物接触不到的地方, 并加锁保存。3. 勿与食品、饮料、粮食、种子、饲料等同储同运。4. 运输过程中要防晒、防雨淋; 装卸人员穿戴防护用具, 要轻搬轻放, 确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。

质量保证期: 1年

备注:

登记证号: PD20242639

登记证持有人: 辽宁先达农业科学有限公司

农药名称: 吡唑啉草酯

剂型: 原药

毒性及其标识: **低毒**

有效成分及其含量:

吡唑啉草酯95%

使用范围和使用方法:

作物/场所	防治对象	用药量(制剂量/亩)	施用方式
-------	------	------------	------

使用技术要求:

产品性能:

吡唑啉草酯是苯甲酰吡唑啉类除草剂, 是对羧苯基丙酮酸双氧化酶(HPPD)抑制剂, 阻碍植物正常的光合作用过程, 杂草表现为叶片白化, 最后整株萎蔫死亡。本品是农药制剂加工的原材料, 不得用于农作物或者其他场所。

注意事项:

1. 接触药剂时应穿戴合适的防护装备, 如穿防护服、佩戴防尘面罩、戴口罩、防护手套等。工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作后, 立即淋浴更衣。2. 废弃塑料袋或其他包装要彻底冲洗, 不能重复使用。把倒空的包装袋或空桶归还厂商或按所在地农药包装废弃管理规定处理。3. 泄漏应急处理: 隔离泄漏污染区, 周围设警告标志, 建议人员戴自给式呼吸器, 穿化学防护服。避免扬尘, 小心扫起, 收集运至废物处理场所。也可以用大量水冲洗, 经稀释的冲洗用水应放入废水系统。对污染地带进行通风。如大量泄漏, 应收集回收经无害处理后再废弃。4. 灭火方法: 消防人员须佩戴完备的呼吸器, 穿戴合适的防护衣并佩戴眼镜、面部保护装备, 用干粉和二氧化碳灭火, 如发生大火时用泡沫和水灭火。此外, 用于灭火的水不得排入排水系统和河道。5. 孕妇及哺乳期妇女避免接触。

中毒急救措施:

使用中或使用后如果感觉不适, 应立即停止工作, 采取急救措施, 并及时携带标签送医院就诊。1. 皮肤接触: 脱去污染的衣物, 立即用大量的清水和肥皂冲洗, 沾染后的衣物应彻底清洗后方可再次穿戴。2. 眼睛溅入: 立即用流动清水冲洗不少于15分钟。3. 吸入: 立即离开施药现场, 转移到空气清新处。4. 误食: 立即停止服用, 用清水充

分漱口后,立即携带农药标签到医院就诊。5.本品无特效解毒剂,应对症治疗。

储存和运输方法:

1.本品应储存在阴凉、干燥、通风、防雨处,不可倒置。远离火源、热源。2.本品应当置于儿童、无关人员及动物接触不到的地方,并加锁保存。3.勿与食品、饮料、粮食、种子、饲料等同储同运。4.运输过程中要防晒、防雨淋;装卸人员穿戴防护用具,要轻搬轻放,确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。

质量保证期:2年

备注:

登记证号:PD20242643

登记证持有人:辽宁先达农业科学有限公司

农药名称:吡唑啉草酯

剂型:可分散油悬浮剂

毒性及其标识:低毒

有效成分及其含量:

吡唑啉草酯5%

使用范围和使用方法:

作物/场所	防治对象	用药量(制剂量/亩)	施用方式
水稻田(直播)	一年生禾本科杂草	150~200毫升/亩	茎叶喷雾

使用技术要求:

1.本品于直播水稻3叶期、田间禾本科杂草2~3叶,茎叶喷雾施药1次。兑水量20~35公斤/亩。施药前排除田水使杂草露出水面。2.药后2天灌水,水层勿淹没水稻心叶避免药害,保持浅水层5~7天。3.在大风时或降雨前不要施药,避免飘移药害。4.每季作物最多使用1次。5.勿超剂量使用;合理安排后茬作物保证安全间隔,后茬不宜种植甜玉米等作物。

产品性能:

吡唑啉草酯是苯甲酰吡唑啉类除草剂,是对羧苯基丙酮酸双氧化酶(HPPD)抑制剂,阻碍植物

正常的光合作用过程,杂草表现为叶片白化,最后整株萎蔫死亡。主要用于直播水稻田防除稗草、千金子等一年生禾本科杂草。

注意事项:

1.本品为可分散油悬浮剂,使用前需充分摇匀。2.农药包装废弃物不得随意丢弃或自行处理,应及时交回农药经营者或农药包装废弃物回收站;禁止在河塘等水体中清洗施药器具,施药后剩余药液不得随意倾倒。3.水产养殖区、河塘等水体及附近禁用;鱼或虾蟹套养稻田禁用;施药后的田水不得直接排入水体。4.本品对皮肤和眼睛有刺激性。使用时应穿长衣长裤、戴手套、护目镜、口罩、帽子、鞋等;不能吸烟、饮食、饮水等;施药后及时用肥皂水洗净手、脸等暴露部位皮肤并更换衣物。5.施药时应喷雾均匀,避免重喷、漏喷或超过推荐剂量用药。6.未用完的制剂应放在包装内保存,切勿将本品置于饮食容器内。7.孕妇及哺乳期妇女避免接触本品。

中毒急救措施:

使用中或使用后如果感觉不适,应立即停止工作,采取急救措施,并及时携带标签送医院就诊。1.皮肤接触:脱去污染的衣物,立即用大量清水和肥皂冲洗,沾染衣物彻底清洗后方可再次穿戴。2.眼睛溅入:立即用流动清水冲洗不少于15分钟。3.吸入:立即离开施药现场,转移到空气清新处。4.误食:立即停止服用,用清水充分漱口后,立即携带标签到医院就诊。5.本品无特效解毒剂,应对症治疗。

储存和运输方法:

1.本品应储存在阴凉、干燥、通风、防雨处,不可倒置。远离火源、热源。2.本品应当置于儿童、无关人员及动物接触不到的地方,并加锁保存。3.勿与食品、饮料、粮食、种子、饲料等同储同运。4.运输过程中要防晒、防雨淋;装卸人员穿戴防护用具,要轻搬轻放,确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。

质量保证期:2年

备注：质量浓度46.5克/升

登记证号：PD20242647

登记证持有人：青岛清原农冠抗性杂草防治有限公司

农药名称：氟砒草胺

剂型：原药

毒性及其标识：**低毒**

有效成分及其含量：

氟砒草胺95%

使用范围和使用方法：

作物/场所	防治对象	用药量(制剂量/亩)	施用方式
-------	------	------------	------

使用技术要求：

产品性能：

本品是农药制剂加工的原材料，不得用于农作物或者其他场所。

注意事项：

1.开启和使用及运输本品过程中应戴口罩、护目镜、手套，穿防护服等，注意保证空气流通，请勿饮食、饮水、吸烟，避免火灾，避免泄漏和粉尘形成。2.远离热源和火源，如着火，可使用泡沫、干粉或二氧化碳灭火，收集被污染物，并妥善处理。3.如泄漏，应用真空吸尘器将泄漏物彻底回收，并装入粉尘桶内密封，待集中处理，避免其污染地表水等生态环境。4.开启和搬运本品后用肥皂和清水彻底清洗暴露在外的皮肤。5.农药包装废弃物不得随意丢弃或自行处置，及时交回农药包装废弃物回收站。6.儿童、孕妇、哺乳期妇女及过敏者避免接触本品。

中毒急救措施：

对眼睛有刺激性，使用时避免药液接触眼睛。急救措施：1.不慎误服，应立即漱口，同时携标签请医生诊治。2.吸入暴露者或在有限空间(密闭或半密闭环境内)接触农药者出现不适时，应立即转移到空气新鲜的地方，保持呼吸道通畅。

3.皮肤污染者应用大量流水冲洗。冲洗时勿疏忽头发、会阴及皮肤皱褶等处。忌用热水，不强调用中和剂。条件允许时，可先用软毛巾轻拭除去附着的农药，再进行冲洗。4.溅入眼睛时，应用清水或生理盐水冲洗至少10分钟。5.解毒剂：无专用解毒剂，请对症治疗。

储存和运输方法：

1.本品应储存在阴凉、干燥、通风、防雨处，不可倒置。远离火源、热源。2.本品应当置于儿童、无关人员及动物接触不到的地方，并加锁保存。3.勿与食品、饮料、粮食、种子、饲料等同储同运。4.运输过程中要防晒、防雨淋；装卸人员穿戴防护用具，要轻搬轻放，确保容器不泄露、不倒塌、不坠落、不损坏。

质量保证期：2年

备注：

登记证号：PD20242648

登记证持有人：青岛清原农冠抗性杂草防治有限公司

农药名称：氟砒草胺

剂型：可溶液剂

毒性及其标识：**低毒**

有效成分及其含量：

氟砒草胺60克/升

使用范围和使用方法：

作物/场所	防治对象	用药量(制剂量/亩)	施用方式
水稻田(直播)	一年生杂草	65~135毫升/亩	茎叶喷雾
移栽水稻田	一年生杂草	65~135毫升/亩	茎叶喷雾

使用技术要求：

1.在直播水稻2叶期后，或移栽水稻插秧后缓苗充分返青之后，杂草1~3叶期，施药前排水使杂草大部分露出水面，茎叶喷雾施药1次。2.推荐用水量15~30公斤/亩。施药后24~72小时内灌水，保持3~5厘米水层5~7天，重新建立水层后勿淹

没水稻心叶避免药害。3.用清水稀释配药,勿用浊水稀释配药,以免降低药效。4.低温、寡照、阴雨天气一定程度影响药效发挥及水稻安全性。5.施药过程中若遇大风、大雨、积水等影响喷雾效果的情形,应停止施药。施药时避免药液飘移到邻近的作物田。6.合理安排后茬作物,后茬可种植玉米、大豆、花生、小麦、油菜、蚕豆、马铃薯、大蒜、菠菜等。7.每季最多使用1次。8.仅限水稻使用。勿超剂量使用。

产品性能:

本品是对羟苯基丙酮酸双氧化酶(HPPD)抑制剂类内吸传导选择性茎叶处理剂,通过茎叶吸收在植物体内传导,可有效防除水稻田(直播)和移栽水稻田一年生杂草。

注意事项:

1.请勿将本品与碱性农药混合使用。2.本品对眼睛有刺激性,使用时应穿长衣、长裤、靴子,戴帽子、护目镜、口罩、手套等防护用具。3.施药期间不可吃东西、饮水、吸烟等;施药后应及时洗手、洗脸等暴露部位皮肤并洗涤施药时穿戴的衣物。4.儿童、孕妇、哺乳期妇女及过敏者避免接触本品。5.农药包装废弃物不得随意丢弃或自行处置,及时交回农药包装废弃物回收站。6.禁止在河塘等水体中清洗施药器具,施药后剩余药液不得随意倾倒。7.水产养殖区、河塘等水体及附近禁用,鱼或虾蟹套养稻田禁用,施药后的田水不得直接排入水体,蚕室及桑园附近禁用。

中毒急救措施:

对眼睛有刺激性,使用时避免药液接触眼睛。急救措施:1.误服者应立即用清水漱口,请医生根据农药毒性、特性及摄入量确定是否进行催吐。2.吸入暴露者或在有限空间(密闭或半密闭环境内)接触农药者出现不适时,应立即转移到空气新鲜的地方,保持呼吸道通畅。3.皮肤污染者应用大量流水冲洗。冲洗时勿疏忽头发、会阴及皮肤皱褶等处。忌用热水,不强调用中和剂。条件允许时,可先用软毛巾轻拭除去附着的农药,再进

行冲洗。4.眼睛受污染时,应用清水或生理盐水冲洗至少10分钟。5.解毒剂:无专用解毒剂,请对症治疗。

储存和运输方法:

1.本品应储存在阴凉、干燥、通风、防雨处,不可倒置。远离火源、热源。2.本品应当置于儿童、无关人员及动物接触不到的地方,并加锁保存。3.勿与食品、饮料、粮食、种子、饲料等同储同运。4.运输过程中要防晒、防雨淋;装卸人员穿戴防护用具,要轻搬轻放,确保容器不泄露、不倒塌、不坠落、不损坏。

质量保证期: 2年

备注:1.氟砒草胺质量分数6%。2.仅限于水稻作物使用。限制在水稻以外作物登记变更。

登记证号: PD20242649

登记证持有人: 青岛清原农冠抗性杂草防治有限公司

农药名称: 敌稗·氟砒草胺

剂型: 微乳剂

毒性及其标识: **低毒**

总有效成分含量: 250克/升

有效成分及其含量:

氟砒草胺30克/升, 敌稗220克/升

使用范围和使用方法:

作物/场所	防治对象	用药量(制剂量/亩)	施用方式
水稻田(直播)	一年生杂草	150~250毫升/亩	茎叶喷雾
移栽水稻田	一年生杂草	150~250毫升/亩	茎叶喷雾

使用技术要求:

1.在直播水稻2叶期后,或移栽水稻插秧后缓苗充分返青之后,杂草1~3叶期,施药前排水使杂草大部分露出水面,茎叶喷雾施药1次,确保均匀喷透。2.推荐用水量15~30公斤/亩。施药后24小时至72小时内灌水,保持3~5厘米水层5~7天,重新建立水层后勿淹没水稻心叶避免药害。3.用清

水稀释配药,勿用浊水稀释配药,以免降低药效。
4.低温、寡照、阴雨天气一定程度影响药效发挥及水稻安全性。5.施药过程中若遇大风、大雨、积水等影响喷雾效果的情形,应停止施药。施药时避免药液飘移到邻近的作物田。6.合理安排后茬作物,后茬可种植玉米、大豆、花生、小麦、油菜、蚕豆、马铃薯、大蒜、菠菜等。7.每季最多使用1次。
8.仅限水稻使用。勿超剂量使用。

产品性能:

本品是由氟砜草胺和敌稗两种不同作用机制的除草剂混配而成,通过杂草茎叶吸收在杂草体内传导,可有效防除水稻田(直播)和移栽水稻田一年生杂草。

注意事项:

1.勿将本品与碱性农药混合使用。2.本品对眼睛有刺激性,使用时应穿长衣、长裤、靴子,戴帽子、护目镜、口罩、手套等防护用具。3.施药期间不可吃东西、饮水、吸烟等,施药后应及时洗手、洗脸并洗涤施药时穿戴的衣物。4.儿童、孕妇、哺乳期妇女及过敏者避免接触本品。5.农药包装废弃物不得随意丢弃或自行处置,及时交回农药包装废弃物回收站。6.禁止在河塘等水体中清洗施药器具,施药后剩余药液不得随意倾倒。7.水产养殖区、河塘等水体及附近禁用,鱼或虾蟹套养稻田禁用,施药后的田水不得直接排入水体,鸟类保护区及附近禁用,蚕室及桑园附近禁用,瓢虫等天敌放飞区禁用。

中毒急救措施:

对眼睛有刺激性,使用时避免药液接触眼睛。急救措施:1.误服者应立即用清水漱口,根据农药毒性、特性及摄入量确定是否进行催吐。2.吸入暴露者或在有限空间(密闭或半密闭环境内)接触农药者出现不适时,应立即转移到空气新鲜的地方,保持呼吸道通畅。3.皮肤污染者应用大量流水冲洗。冲洗时勿疏忽头发、会阴及皮肤皱褶等处。忌用热水,不强调用中和剂。条件允许时,可先用软毛巾轻拭除去附着的农药,再进行冲

洗。4.眼睛受污染时,应用清水或生理盐水冲洗至少10分钟。5.解毒剂:无专用解毒剂,请对症治疗。

储存和运输方法:

1.本品应储存在阴凉、干燥、通风、防雨处,不可倒置。远离火源、热源。2.本品应当置于儿童、无关人员及动物接触不到的地方,并加锁保存。3.勿与食品、饮料、粮食、种子、饲料等同储同运。4.运输过程中要防晒、防雨淋;装卸人员穿戴防护用具,要轻搬轻放,确保容器不泄露、不倒塌、不坠落、不损坏。

质量保证期: 2年

备注: 1.质量分数23.2%(氟砜草胺质量分数2.8%,敌稗质量分数20.4%)。2.仅限于水稻作物使用。限制在水稻以外作物登记变更。

登记证号: PD20242640

登记证持有人: 山东清原农冠作物科学有限公司

农药名称: 氟草啶

剂型: 原药

毒性及其标识: **低毒**

有效成分及其含量:

氟草啶95%

使用范围和使用方法:

作物/场所	防治对象	用药量(制剂量/亩)	施用方式
-------	------	------------	------

使用技术要求:

产品性能:

本品是原卟啉原氧化酶抑制剂,为灭生性触杀性茎叶除草剂。本品是农药制剂加工的原材料,不得用于农作物或者其他场所。

注意事项:

1.开启和运输本品过程中应戴口罩、防护面罩或护目镜、口罩、手套,穿防护服等,注意保证空气流通,请勿饮食、饮水、吸烟,避免火灾,避免

泄漏和粉尘形成。2.远离热源和火源,如着火,可使用泡沫、干粉或二氧化碳灭火,收集被污染物,并妥善处理。3.如泄漏,应用真空吸尘器将泄漏物彻底回收,并装入粉尘桶内密封,待集中处理,避免其污染地表水等生态环境。4.开启和搬运本品后用肥皂和清水彻底清洗暴露在外的皮肤。5.其包装倒空洗净后应妥善处理,不可他用。6.儿童、孕妇、哺乳期妇女及过敏者避免接触本品。7.对水生生物高毒。

中毒急救措施:

本品对眼睛有刺激性。急救措施:1.误服者应立即用清水漱口,请医生根据农药毒性、特性确定是否进行催吐。2.吸入暴露者或在有限空间(密闭或半密闭环境内)接触农药者出现不适时,应立即转移到空气新鲜的地方,保持呼吸道通畅。3.皮肤污染者应用大量流水冲洗,忌用热水。冲洗时勿遗漏头发、会阴及皮肤皱褶等处。条件允许时,可先用软毛巾轻拭除去附着的农药,再进行冲洗。4.眼睛受污染时,应用清水或生理盐水冲洗至少10分钟。5.解毒剂:无专用解毒剂,请对症治疗。6.有任何不良反应请立即携标签就医诊治。

储存和运输方法:

1.本品应储存在阴凉、干燥、通风、防雨处,不可倒置。远离火源、热源。2.本品应当置于儿童、无关人员及动物接触不到的地方,并加锁保存。3.勿与食品、饮料、粮食、种子、饲料等同储同运。4.运输过程中要防晒、防雨淋;装卸人员应当穿戴安全防护用具,要轻搬轻放,确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。

质量保证期:2年

备注:

登记证号:PD20242646

登记证持有人:山东清原农冠作物科学有限公司

农药名称:氟草啶

剂型:乳油

毒性及其标识:低毒

有效成分及其含量:

氟草啶40克/升

使用范围和使用方法:

作物/场所	防治对象	用药量(制剂量/亩)	施用方式
滩涂	互花米草、芦苇等杂草	50~100毫升/亩	茎叶喷雾
非耕地	杂草	100~150毫升/亩	茎叶喷雾

使用技术要求:

1.在非耕地杂草生长旺盛时期、在滩涂互花米草、芦苇生长旺盛时期均匀茎叶喷雾施药1次,兑水30~45公斤/亩,确保喷湿、喷透。2.用清水稀释,勿用浊水稀释,以免降低药效。3.天气干旱、气温较低及杂草密度较大或防除大龄杂草及多年生恶性杂草时,可在登记范围内选用较高剂量。4.施药过程中若遇大风、大雨、积水等影响喷雾效果的情形,应停止施药,施药时避免药液飘移到邻近作物田,注意避免飘移药害。5.禁止在田间道路、田埂、果树行间、休耕地、林场林地等农林业区域使用;禁止在水生植物种养区、水产养殖区、红树林生态系统等自然保护区及其周围使用。6.防治滩涂互花米草时,仅限用于互花米草治理区,且使用区域应采取必要的隔离措施。

产品性能:

本品是原卟啉原氧化酶抑制剂,为灭生性触杀性茎叶除草剂,可防除非耕地杂草,滩涂互花米草、芦苇等杂草。

注意事项:

1.请勿将本品与碱性农药混合使用。2.本品对眼睛和皮肤有刺激性。使用时应穿长衣、长裤、靴子,戴帽子、护目镜、口罩、手套等防护用具。3.施药期间不可吃东西、饮水、吸烟等;施药后应及时洗手、洗脸等暴露部位皮肤并洗涤施药时穿戴的衣物。4.儿童、孕妇、哺乳期妇女及过敏者避免接触本品。5.农药包装废弃物不得随意丢弃或自行处理,应及时交回农药经营者或农药包装

废弃物回收站；禁止在河塘等水体中清洗施药器具，施药后剩余药液不得随意倾倒。6.禁止用铁质容器盛放或使用本品。7.本品与常见氧化剂不相容，避免与氧化剂接触混合。8.使用过的施药器械包括管线需清洗3遍。

中毒急救措施：

本品对眼睛和皮肤有刺激性。急救措施：1.误服者应立即用清水漱口，根据农药毒性、特性及摄入量确定是否进行催吐。2.吸入暴露者或在有限空间（密闭或半密闭环境内）接触农药者出现不适时，应立即转移到空气新鲜的地方，保持呼吸道通畅。3.皮肤污染者应用大量流水冲洗，忌用热水。冲洗时勿遗漏头发、会阴及皮肤皱褶等处。条件允许时，可先用软毛巾轻拭除去附着的农药，再进行冲洗。4.眼睛受污染时，应用清水或生理盐水冲洗至少10分钟。5.解毒剂：无专用解毒剂，请对症治疗。6.有任何不良反应请立即携标签就医诊治。

储存和运输方法：

1.本品应储存在阴凉、干燥、通风、防雨处，不可倒置。远离火源、热源。2.本品应当置于儿童、无关人员及动物接触不到的地方，并加锁保存。3.勿与食品、饮料、粮食、种子、饲料等同储同运。4.运输过程中要防晒、防雨淋；装卸人员穿戴防护用具，要轻搬轻放，确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。

质量保证期：2年

备注：质量分数4.3%。

登记证号：PD20242644

登记证持有人：山东清原农冠作物科学有限公司

农药名称：草铵膦·氟草啶

剂型：微乳剂

毒性及其标识：**低毒**

总有效成分含量：210克/升

有效成分及其含量：

草铵膦200克/升，氟草啶10克/升

使用范围和使用方法：

作物/场所	防治对象	用药量（制剂量/亩）	施用方式
非耕地	杂草	150~300毫升/亩	茎叶喷雾

使用技术要求：

1.在非耕地杂草生长旺盛时期均匀茎叶喷雾施药1次，兑水30~45公斤/亩，确保喷湿、喷透。2.用清水稀释，勿用浊水稀释，以免降低药效。3.天气干旱、气温较低及杂草密度较大或防除大龄杂草及多年生恶性杂草时，在登记剂量范围内酌情增加用药量和用水量。4.施药过程中若遇大风、大雨、积水等影响喷雾效果的情形，应停止施药，施药时避免药液飘移到邻近作物田。5.禁止在田间道路、田埂、果树行间、休耕地、林场林地等农林业区域使用；注意避免飘移药害。

产品性能：

本品是由草铵膦和氟草啶混配而成的灭生性茎叶处理剂，可通过杂草绿色茎叶吸收传导到根部，有效防除非耕地杂草。

注意事项：

1.请勿将本品与碱性农药混合使用。2.本品对眼睛有刺激性。使用时应穿长衣、长裤、靴子，戴帽子、护目镜、口罩、手套等防护用具。3.施药期间不可吃东西、饮水、吸烟等；施药后应及时洗手、洗脸等暴露部位皮肤并洗涤施药时穿戴的衣物。4.儿童、孕妇、哺乳期妇女及过敏者避免接触本品。5.农药包装废弃物不得随意丢弃或自行处理，应及时交回农药经营者或农药包装废弃物回收站；禁止在河塘等水体中清洗施药器具，施药后剩余药液不得随意倾倒；水产养殖区、河塘等水体及附近禁用；蚕室和桑园附近禁用。6.禁止用铁质容器盛放或使用本品。7.本品与常见氧化剂不相容，避免与氧化剂接触或混合。8.使用过的施药器械包括管线需清洗3遍。

中毒急救措施：

本品对眼睛有刺激性。急救措施：1.误服者应立即用清水漱口，根据农药毒性、特性及摄入量确定是否进行催吐。2.吸入暴露者或在有限空间（密闭或半密闭环境内）接触农药者出现不适时，应立即转移到空气新鲜的地方，保持呼吸道通畅。3.皮肤污染者应用大量流水冲洗，忌用热水。冲洗时勿遗漏头发、会阴及皮肤皱褶等处。条件允许时，可先用软毛巾轻拭除去附着的农药，再进行冲洗。4.眼睛受污染时，应用清水或生理盐水冲洗至少10分钟。5.解毒剂：无专用解毒剂，请对症下药。6.有任何不良反应请立即携标签就医诊治。

储存和运输方法：

1.本品应储存在阴凉、干燥、通风、防雨处，不可倒置。远离火源、热源。2.本品应当置于儿童、无关人员及动物接触不到的地方，并加锁保存。3.勿与食品、饮料、粮食、种子、饲料等同储同运。4.运输过程中要防晒、防雨淋；装卸人员穿戴防护用具，要轻搬轻放，确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。

质量保证期：2年

备注：质量分数18.79%（草铵膦17.9%，氟草啶0.89%）。

登记证号：PD20242645

登记证持有人：山东清原农冠作物科学有限公司

农药名称：氟草啶·精草铵膦

剂型：微乳剂

毒性及其标识：**低毒**

总有效成分含量：110克/升

有效成分及其含量：

氟草啶10克/升，精草铵膦100克/升

使用范围和使用方法：

作物/场所	防治对象	用药量（制剂量/亩）	施用方式
柑橘园	杂草	150~300毫升/亩	定向茎叶喷雾
非耕地	杂草	150~300毫升/亩	茎叶喷雾

使用技术要求：

1.在非耕地杂草生长旺盛时期均匀茎叶喷雾施药1次，兑水30~45公斤/亩，确保喷湿、喷透。2.柑橘园除草时，在柑橘园杂草生长旺盛时期，使用带保护罩的喷雾器均匀定向茎叶喷雾施药1次，喷头应加防护罩防止药液飘移，以免发生药害。3.用清水稀释，勿用浊水稀释，以免降低药效。4.天气干旱、气温较低及杂草密度较大或防除大龄杂草及多年生恶性杂草时，在登记剂量范围内酌情增加用药量和用水量。5.施药过程中若遇大风、大雨、积水等影响喷雾效果的情形，应停止施药，施药时避免药液飘移到邻近作物田。6.禁止在田间道路、田埂、休耕地、林场林地等农林业区域使用；注意避免飘移药害。7.最多施用1次，柑橘上安全间隔期为21天。

产品性能：

本品是由氟草啶和精草铵膦两种不同作用机制的除草剂混配而成的灭生性茎叶除草剂，可通过杂草绿色茎叶吸收传导到根部，可有效防除非耕地、柑橘园杂草。

注意事项：

1.请勿将本品与碱性农药混合使用。2.本品对皮肤和眼睛有刺激性。使用时应穿长衣、长裤、靴子，戴帽子、护目镜、口罩、手套等防护用具。3.施药期间不可吃东西、饮水、吸烟等；施药后应及时洗手、洗脸等暴露部位皮肤并洗涤施药时穿戴的衣物。4.儿童、孕妇、哺乳期妇女及过敏者避免接触本品。5.农药包装废弃物不得随意丢弃或自行处理，应及时交回农药经营者或农药包装废弃物回收站；禁止在河塘等水体中清洗施药器具，施药后剩余药液不得随意倾倒。6.水产养殖区、河塘等水体及附近禁用；蚕室和桑园附近禁用；赤眼蜂等天敌放飞区禁用。7.禁止用铁质容器盛放或使用本品。8.使用过的施药器械包括管线需清洗3遍。

中毒急救措施：

本品对眼睛和皮肤有刺激性。急救措施：1.误服者应立即用清水漱口，根据农药毒性、特性及摄入量确定是否进行催吐。2.吸入暴露者或在有限空间（密闭或半密闭环境内）接触农药者出现不适时，应立即转移到空气新鲜的地方，保持呼吸道通畅。3.皮肤污染者应用大量流水冲洗，忌用热水。冲洗时勿遗漏头发、会阴及皮肤皱褶等处。条件允许时，可先用软毛巾轻拭除去附着的农药，再进行冲洗。4.眼睛受污染时，应用清水或生理盐水冲洗至少10分钟。5.解毒剂：无专用解毒剂，请对症治疗。6.有任何不良反应请立即携标签就医诊治。

储存和运输方法：

1.本品应储存在阴凉、干燥、通风、防雨处，不可倒置。远离火源、热源。2.本品应当置于儿童、无关人员及动物接触不到的地方，并加锁保存。3.勿与食品、饮料、粮食、种子、饲料等同储同运。4.运输过程中要防晒、防雨淋；装卸人员穿戴防护用具，要轻搬轻放，确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。

质量保证期：2年

备注：质量分数10.01%（精草铵膦9.1%，氟草啶0.91%）。精草铵膦铵盐9.9%，108克/升。

登记证号：PD20242641

登记证持有人：宁波纽康生物技术有限公司

农药名称：玉米螟性诱剂

剂型：挥散芯

毒性及其标识：**低毒**

总有效成分含量：0.15%

有效成分及其含量：

反-12-十四碳烯乙酸酯0.06%，十四醇乙酸酯0.03%，顺-12-十四碳烯乙酸酯0.06%

使用范围和使用方法：

作物/场所	防治对象	用药量（制剂量/亩）	施用方式
玉米	玉米螟	1~2个挥散芯/亩	诱捕

使用技术要求：

1.诱芯需要与诱捕器配套使用，每个诱捕器配一枚诱芯。2.于玉米螟成虫羽化前1周左右，将挥散芯放置于带支架的诱捕器中，将诱捕器插在玉米地垄上。每季使用1次，视害虫发生情况，隔90天可以更换一次挥散芯。3.诱捕器按照外密内疏方式排列，诱捕器之间间隔25~30米，底部离地1.2~1.5米。

产品性能：

本品属于昆虫性信息素类产品，对玉米螟成虫具有引诱效果。于玉米螟羽化前与诱捕器配合使用，可控制下代玉米螟虫口数量，达到防治效果。

注意事项：

1.本品不可单独使用，必须与诱捕器配合使用，才可达到诱捕防治的效果；使用时诱捕器的高度、方位等要严格按照使用说明放置。2.使用时要严格掌握使用时间，宁早勿晚，于成虫羽化前1周开始使用，否则诱捕效果会降低。3.诱捕器内虫量过多时，需要及时清除诱捕器内的死虫。4.在作物生长的各个时期均可以使用。5.使用时或者更换不同种类的诱芯产品时需要戴手套、口罩等，避免不同诱芯间的相互影响。更换诱芯后应及时洗手。6.农药包装废弃物不得随意丢弃或自行处理，应及时交回农药经营者或农药包装废弃物回收站；使用后的挥散芯不得随意丢弃，避免污染河塘等水体。7.孕妇与哺乳期妇女禁止接触本品。

中毒急救措施：

如不慎接触皮肤，请使用大量清水冲洗，若仍有不适立即携标签送医诊治。如不慎溅入眼睛，应立即使用大量清水冲洗，若仍有不适立即送医诊治。如不慎吸入大量挥发物，应将病人移至空气新鲜处。有中毒症状应立即送医。如不慎误食，不要随意催吐，应立即就医。

储存和运输方法：

1.本品应储存在阴凉、干燥、通风、防雨处，

不可倒置。远离火源、热源。本品应在-18℃条件下储存和运输。2.本品应当置于儿童、无关人员及动物接触不到的地方,并加锁保存。3.勿与食品、饮料、粮食、种子、饲料等同储同运。4.运输过程中要防晒、防雨淋;装卸人员穿戴防护用具,要轻

搬轻放,确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。

质量保证期:1年

备注:

中华人民共和国农业农村部公告

第 828 号

根据《兽药管理条例》《兽药注册办法》和《兽药注册评审工作程序》(农业农村部公告第392号)规定,华派生物技术(集团)股份有限公司等3家单位研制的兔病毒性出血症杆状病毒载体二价灭活疫苗(HP1-VP60株+HP2-VP60株)等2种兽药产品,已通过农业农村部组织的应急评价,现发布产品工艺流程、质量标准、说明书和标签,自发布之日起执行。

批准硕腾公司转国内生产的猪圆环病毒1-2型嵌合体、支原体肺炎二联灭活疫苗兽药产品的工艺流程、质量标准、说明书和标签,自发布之日起执行。

特此公告。

- 附件: 1. 兽药产品目录
2. 转国内生产兽药产品目录
3. 工艺流程
4. 质量标准
5. 说明书和标签

农业农村部

2024年9月22日

附件1

兽药产品目录

兽药名称	研制单位或生产企业
兔病毒性出血症杆状病毒载体二价灭活疫苗(HP1-VP60株+HP2-VP60株)	华派生物技术(集团)股份有限公司
兔出血症病毒1型、2型二价杆状病毒载体灭活疫苗(BAC-WF株+BAC-SC株)	江苏省农业科学院兽医研究所、兆丰华生物科技(南京)有限公司

附件2

转国内生产兽药产品目录

兽药名称	生产企业	进口兽药注册证书所属单位	进口兽药注册证书号/公告号
猪圆环病毒1-2型嵌合体、支原体肺炎二联灭活疫苗	硕腾生物制药有限公司	硕腾公司 Zoetis Inc	(2021)外兽药证字12号/中华人民共和国农业农村部公告第404号

附件3(略)

附件4(略)

附件5

说明书和标签

一、兔病毒性出血症杆状病毒载体二价灭活疫苗(HP1-VP60株+HP2-VP60株)说明书和标签

(一)兔病毒性出血症杆状病毒载体二价灭活疫苗(HP1-VP60株+HP2-VP60株)说明书

兽用

【兽药名称】

通用名 兔病毒性出血症杆状病毒载体二价灭活疫苗(HP1-VP60株+HP2-VP60株)

商品名 无

汉语拼音 Tu Bingduxingchuxuezheng Ganzhuangbingduzaiti Erjia Miehuyimiao (HP1-VP60 Zhu+HP2-VP60 Zhu)

英文名 Rabbit Hemorrhagic Disease Baculovirus Vector Bivalent Vaccine, Inactivated (Strain HP1-VP60+ Strain HP2-VP60)

【主要成分与含量】 疫苗中含有灭活的兔病毒性出血症1型重组杆状病毒HP1-VP60株、兔病毒性出血症2型重组杆状病毒HP2-VP60株,两种抗原的血凝价均为1:256。

【性状】 静置后,上层为无色或淡黄色澄清液体,下层为浅白色沉淀,振摇后呈浅白色或淡黄色均匀混悬液。

【作用与用途】 用于预防兔病毒性出血症1型和2型感染,接种后14日产生免疫力,免疫期为6个月。

【用法与用量】 皮下注射。30日龄以上的健康兔,每只1.0ml。

【不良反应】 部分兔注射后可能出现一过性食欲减退的现象。

【注意事项】 (1) 未使用过本疫苗的地区, 应先小范围试用, 观察3~5日, 证明确实安全后才可以使
用。

(2) 紧急预防接种时应先在疫区周围使用, 再到疫区使用。

(3) 本品应在规定条件下保存, 严防冻结。冻结过的疫苗禁用。

(4) 疫苗过期、变色或疫苗瓶破损均不得使用。

(5) 疫苗应恢复至常温使用, 使用前及使用过程中均应充分摇匀。

(6) 针头、注射器应灭菌, 注射部位应消毒, 每只兔子应更换针头。

(7) 疫苗开封后须4个小时内用完。

(8) 用过的疫苗瓶、器具和未用完的疫苗等应进行无害化处理。

【规格】

【包装】

【贮藏与有效期】 2~8℃保存, 有效期为18个月。

【批准文号】

【生产企业】

仅在兽医指导下使用

(二) 兔病毒性出血症杆状病毒载体二价灭活疫苗 (HP1-VP60株+HP2-VP60株) 标签

兽用

兔病毒性出血症杆状病毒载体二价灭活疫苗 (HP1-VP60株+HP2-VP60株)

批准文号:

批号:

有效期至:

【作用与用途】 用于预防兔病毒性出血症1型和2型感染, 接种后14日产生免疫力, 免疫期为6个月。

【用法与用量】 皮下注射。30日龄以上的健康兔, 每只1.0ml。

【贮藏与有效期】 2~8℃保存, 有效期为18个月。

【生产企业】

仅在兽医指导下使用

二、猪圆环病毒1-2型嵌合体、支原体肺炎二联灭活疫苗说明书和标

签

(一) 猪圆环病毒1-2型嵌合体、支原体肺炎二联灭活疫苗说明书

兽用

【兽药名称】

通用名 称猪圆环病毒1-2型嵌合体、支原体肺炎二联灭活疫苗

商品名称 无

英文名称 Porcine Circovirus Vaccine, Type1-Type 2 Chimera, Killed Virus, Mycoplasma

Hyopneumoniae Bacterin

汉语拼音 Zhu Yuanhuanbingdu Yi-er Xing Qianheti , Zhiyuantifeiyan Erlian Miehuyimiao

【主要成分与含量】 每头份疫苗中含有猪圆环病毒1-2型嵌合体和猪肺炎支原体(P-5722-3株)抗原相对效力(RP值)不低于1.0。

【性状】 淡粉色至灰白色至浅褐色溶液。

【作用与用途】 用于预防猪圆环病毒2型引起的感染和猪支原体肺炎。接种后3周产生免疫力。免疫期为23周。

【用法与用量】 肌肉注射。用于3周龄或3周龄以上的健康猪, 每头猪2ml。

【不良反应】 很少发生过敏反应, 必要时使用肾上腺素等脱敏措施抢救。

【注意事项】 (1) 仅用于接种健康猪。

(2) 切忌冻结。

(3) 使用前摇匀, 接种时注意无菌操作。

(4) 疫苗开封后, 应一次用完。

(5) 屠宰前21日内禁用。

(6) 疫苗中含有庆大霉素和硫柳汞。

(7) 用过的疫苗瓶、器具和未用完的疫苗等应进行无害化处理。

【规格】

【贮藏与有效期】 2~8℃保存, 有效期为24个月。

【批准文号】

【生产企业】

仅在兽医指导下使用

(二) 猪圆环病毒1-2型嵌合体、支原体肺炎二联灭活疫苗标签

兽用

猪圆环病毒1-2型嵌合体、支原体肺炎二联灭活疫苗

批准文号:

批号:

有效期至:

【作用与用途】 用于预防猪圆环病毒2型引起的感染和猪支原体肺炎。接种后3周产生免疫力。免疫期为23周。

【用法与用量】 肌肉注射。用于3周龄或3周龄以上的健康猪, 每头猪2ml。

【贮藏与有效期】 2~8℃保存, 有效期为24个月。

【生产企业】

仅在兽医指导下使用

中华人民共和国农业农村部公告

第 829 号

为贯彻落实党中央、国务院关于优化政务服务、提升行政效能的部署要求，加快推进电子证照扩大应用领域和全国互通互认，促进政务服务标准化、规范化、便利化，农业农村部决定推行应用农业行政审批有关电子证照。现就有关事项公告如下：

一、自2024年11月1日起，在全国范围内推行应用农业农村部本级颁发的《农药登记证》《农药登记试验单位证书》《肥料登记证》《兽药产品批准文号批件》《国（境）外引进农业种苗检疫审批单》共5种电子证照。电子证照与纸质证照同步制发、并行使用，具有同等法律效力。自2025年1月1日起，不再制发相应的纸质证照。

二、电子证照分别加盖中华人民共和国农业农村部审批专用章的电子印章，具体版式附后。

三、已经制发仍在有效期内的纸质证照可继续使用，直至下次换发时更换电子证照。

四、申请人可登录农业农村部政务服务平台（<https://zwfw.moa.gov.cn>），查看和下载电子证照。

五、社会公众可通过农业农村部政务服务平台核验电子证照有效性，或通过手机浏览器扫描电子证照二维码查询证照信息。

六、各级农业农村部门要充分认识到推行应用电子证照的重要意义，更好发挥电子证照在行政审批减环节、减材料、减时限等方面的重要作用，凡通过电子证照可以获取的信息，不再要求提供相应纸质材料。

附件：1.《农药登记证》电子证照样式

2.《农药登记试验单位证书》电子证照样式

3.《肥料登记证》（化学肥料）电子证照样式

4.《肥料登记证》（微生物肥料）电子证照样式

5.《兽药产品批准文号批件》电子证照样式

6.《国（境）外引进农业种苗检疫审批单》电子证照样式

农业农村部

2024年10月7日

附件1

《农药登记证》电子证照

农 药 登 记 证

查询
二维码
25×25

登记证号: 总有效成分含量:
 登记证持有人: 有效成分及含量:
 农药名称:
 剂 型:
 农药类别: 毒 性:

使用范围和使用方法:

作物/场所	防治对象	用药量	施用方式
×××	×××××	×××××××	××××
以	下	空	自

备 注:

首次批准日期: 年月日
 有效期至: 年月日

中华人民共和国农业农村部
年月日

附件2

《农药登记试验单位证书》电子证照

农 药 登 记 试 验 单 位 证 书

编 号:
 试 验 单 位 名 称:
 统 一 社 会 信 用 代 码:
 法 定 代 表 人 (负 责 人):
 住 所:
 实 验 室 地 址:
 试 验 范 围:
 有 效 期:

查询
二维码
25×25

中华人民共和国农业农村部
年月日

附件3

《肥料登记证》(化学肥料) 电子证照

生产企业:	<input type="text"/>
	产品通用名:	<input type="text"/>
中华人民共和国 肥料登记证	商品名:	<input type="text"/>
	产品形态:	<input type="text"/>
登记证号: <input type="text"/>	主要技术指标:	<input type="text"/>
经农业农村部肥料登记评审委员会审定, 该产品准予肥料登记, 特此发证。	适用于:	<input type="text"/>
中华人民共和国农业农村部制	发证日期:	42 × 42 年 月 日
	有效期至:	年 月
	查询 二维码 25 × 25	

附件4

《肥料登记证》(微生物肥料) 电子证照

生产企业:	<input type="text"/>
	产品通用名:	<input type="text"/>
中华人民共和国 肥料登记证	商品名:	<input type="text"/>
	产品形态:	<input type="text"/>
登记证号: <input type="text"/>	有效菌种名称:	<input type="text"/>
经农业农村部肥料登记评审委员会审定, 该产品准予肥料登记, 特此发证。	主要技术指标:	<input type="text"/>
中华人民共和国农业农村部制	适用于:	<input type="text"/>
	发证日期:	42 × 42 年 月 日
	有效期至:	年 月
	查询 二维码 25 × 25	

附件5

《兽药产品批准文号批件》电子证照

中华人民共和国农业农村部
兽药产品批准文号批件

批件号: []

根据《兽药管理条例》《兽药产品批准文号管理办法》等有关规定,该产品经审查符合要求,准予生产。

企业名称: []
生产地址: []
通用名称: []
商品名称: []
含量规格: []
发证日期: []

兽药产品批准文号: []
有效期: []
监测期: []

查询
二维码
25×25

42×42

附件6

《国(境)外引进农业种苗检疫审批单》电子证照

国(境)外引进农业种苗检疫审批单 二维码 25×25

编号: [] 有效期至: []

申请单位	名称	地址	联系人	联系电话
植物中文名	植物学名	原产国(地区)	种苗类型	引种用途
输出国(地区)	种植地区	审批数量		

检疫要求

(注:请在对外贸易合同或协议中注明以上检疫要求:)

审批意见

签发人: [] 50×16 签发日期: []

42×42

中华人民共和国农业农村部公告

第 830 号

恒丰728D等27个转基因玉米品种、中联豆5046等3个转基因大豆品种，业经第五届国家农作物品种审定委员会第六次会议审定通过，现予公告。

附件：恒丰728D等30个转基因品种审定信息

农业农村部
2024年9月30日

(附件见农业农村部公报网络版, [http:// www.moa.gov.cn](http://www.moa.gov.cn))

中华人民共和国农业农村部公告

第 831 号

根据《兽药管理条例》和《兽药注册办法》规定，经审查，批准昆山博青生物科技有限公司等6家单位申报的复方溶葡萄球菌酶氯己定喷剂等4种兽药产品为新兽药，核发《新兽药注册证书》，发布产品工艺规程、质量标准、说明书和标签，自发布之日起执行。

批准北京生泰尔科技股份有限公司等4家单位申报的芪翁黄柏散兽药产品变更注册，发布修订后的说明书和标签，自发布之日起执行；批准中国农业科学院特产研究所等11家单位申报的水貂细小病毒性肠炎灭活疫苗(MEVB株)等2种兽药产品变更注册，申请人按照农业农村部批准的变更事项，自行修改原批准的说明书和标签对应内容，并印制、使用。

特此公告。

- 附件：1.新兽药注册目录
2.兽药变更注册目录
3.工艺规程
4.质量标准
5.说明书和标签

农业农村部
2024年9月28日

附件1

新兽药注册目录

新兽药名称	研制单位	类别	新兽药注册证书号	监测期
复方溶葡萄球菌酶氯己定喷剂	昆山博青生物科技有限公司	三类	(2024) 新兽药证字48号	3年
猪伪狂犬病活疫苗(HN1201-R1株)	普莱柯生物工程股份有限公司、洛阳惠中生物技术有限公司	三类	(2024) 新兽药证字49号	3年
猪伪狂犬病活疫苗(HB-98株, 悬浮培养)	武汉科前生物股份有限公司	三类	(2024) 新兽药证字50号	3年
鸡新城疫、禽流感(H9亚型)、禽腺病毒病(1群, 4型)三联灭活疫苗(La Sota株+F6株+LC株)	齐鲁动物保健品有限公司、哈药集团生物疫苗有限公司	三类	(2024) 新兽药证字51号	3年

附件2

兽药变更注册目录

兽药名称	申请单位	兽药标准来源	变更事项	监测期 (针对变更事项)
芪翁黄柏散	北京生泰尔科技股份有限公司、爱迪森(北京)生物科技有限公司、北京喜禽药业有限公司、生泰尔(内蒙古)科技有限公司	(2020) 新兽药证字 65号	增加靶动物生长育肥猪	3年
水貂细小病毒性肠炎灭活疫苗(MEVB株)	中国农业科学院特产研究所、吉林特研生物技术有限责任公司	(2009) 新兽药证字 39号	贮藏与有效期由“2~8℃保存, 有效期为10个月”变更为“2~8℃保存, 有效期为18个月”	/
泰地罗新注射液	湖北回盛生物科技有限公司、江苏恒丰强生物技术有限公司、山东华辰制药有限公司、武汉回盛生物科技股份有限公司、艾美科健(中国)生物医药有限公司、山东久隆恒信药业有限公司、长沙施比龙动物药业有限公司、华中农业大学、保定冀中生物科技有限公司	(2021) 新兽药证字 02号	在20ml:0.8g规格基础上, 增加50ml:2.0g、100ml:4.0g规格	/

附件3(略)

附件4(略)

附件5

说明书和标签

一、复方溶葡萄球菌酶氯己定喷剂说明书和标签

(一) 复方溶葡萄球菌酶氯己定喷剂说明书

宠物用 外用

【兽药名称】

通用名称: 复方溶葡萄球菌酶氯己定喷剂

商品名称:

英文名称: Compound Lysostaphin and Chlorhexidine Spray

汉语拼音: Fufang Rongputaoqiujunmei Lüjiding Penji

【主要成分】 重组溶葡萄球菌酶、溶菌酶、醋酸氯己定

【性状】 本品为无色、无异味液体, 均匀不分层。

【药理作用】 本品对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、溶血性链球菌、白色念珠菌具有良好的杀灭和抑制作用。重组溶葡萄球菌酶作用机制是裂解细菌细胞壁肽聚糖中的五甘氨酸肽键桥, 使细菌裂解死亡。溶菌酶作用机制是水解细菌细胞壁肽聚糖的N-乙酰胞壁酸与N-乙酰葡萄糖胺之间的 β -1,4糖苷键, 使细菌裂解死亡。醋酸氯己定为阳离子表面活性剂, 作用机制是改变细胞膜的通透性, 使细胞内容物漏出。

【用途】 用于犬皮肤、黏膜的消毒; 用于橡胶制品、织物和小件不锈钢器械的消毒。

【用法与用量】 犬皮肤、黏膜的消毒: 均匀喷洒于患处, 每次3~5喷(以患处5×5cm为计); 橡胶制品、织物和小件不锈钢器械的消毒: 均匀喷洒至完全湿润。

【不良反应】 按规定的用法与用量使用尚未见不良反应。

【注意事项】 1. 禁与汞、甲醛、碘酊、高锰酸钾等消毒剂配伍应用。

2. 本品不能与肥皂、碱性物质和其他阴离子表面活性剂混合使用。

【休药期】 无需制定

【规格】 (1) 30ml: 重组溶葡萄球菌酶30U+溶菌酶1200000U+醋酸氯己定0.03g (2) 60ml: 重组溶葡萄球菌酶60U+溶菌酶2400000U+醋酸氯己定0.06g

【包装】

【贮藏】 密闭, 在阴凉处保存。

【有效期】 24个月

【批准文号】

【生产企业】

(二) 复方溶葡萄球菌酶氯己定喷剂标签

宠物用 外用

【兽药名称】

通用名称: 复方溶葡萄球菌酶氯己定喷剂

商品名称:

英文名称: Compound Lysostaphin and Chlorhexidine Spray

汉语拼音: Fufang Rongputaoqiujunmei Lüjiding Penji

【主要成分】 重组溶葡萄球菌酶、溶菌酶、醋酸氯己定

【性状】 本品为无色、无异味液体, 均匀不分层。

【用途】 用于犬皮肤、黏膜的消毒; 用于橡胶制品、织物和小件不锈钢器械的消毒。

【用法与用量】 犬皮肤、黏膜的消毒: 均匀喷洒于患处, 每次3~5喷(以患处5×5cm为计); 橡胶制品、织物和小件不锈钢器械的消毒: 均匀喷洒至完全湿润。

【规格】 (1) 30ml: 重组溶葡萄球菌酶30U+溶菌酶1200000U+醋酸氯己定0.03g (2) 60ml: 重组溶葡萄球菌酶60U+溶菌酶2400000U+醋酸氯己定0.06g

【批准文号】

【生产日期】

【生产批号】

【有效期】至

【休药期】 无需制定

【包装】

【贮藏】 密闭, 在阴凉处保存。

【生产企业】

二、猪伪狂犬病活疫苗(HN1201-R1株)说明书和标签

(一) 猪伪狂犬病活疫苗(HN1201-R1株)说明书

兽用

【兽药名称】

通用名称 猪伪狂犬病活疫苗(HN1201-R1株)

商品名称 无

英文名称 Swine Pseudorabies Vaccine, Live (Strain HN1201-R1)

汉语拼音 Zhu Weikuangquanbing Huoyimiao (HN1201-R1 Zhu)

【主要成分与含量】 含猪伪狂犬病病毒HN1201-R1株, 每头份病毒含量 $\geq 10^{5.0}$ TCID₅₀。

【性状】 淡粉色海绵状疏松团块, 易与瓶壁脱离, 加稀释液后迅速溶解。

【作用与用途】 用于预防猪伪狂犬病。免疫期为6个月，免疫产生期为免疫后14日。

【用法与用量】 按瓶签注明头份，用专用稀释液或灭菌生理盐水稀释成1头份/ml。肌肉注射1.0ml。仔猪40~60日龄免疫1次，种猪每6个月免疫1次。

【不良反应】 在敏感个体上注射后可能出现过敏反应，可用抗过敏药物（如地塞米松、肾上腺素等）进行治疗，同时采用适当的辅助治疗措施。

【注意事项】 (1) 仅用于接种健康猪。

(2) 应用专用的稀释液或灭菌生理盐水稀释疫苗。

(3) 疫苗在运输、保存、使用过程中，应防止高温、消毒剂和阳光照射。

(4) 应对注射部位进行严格消毒。

(5) 疫苗稀释后限2小时内用完。

(6) 剩余的疫苗及用具，应经消毒处理后废弃。

【规格】 (1) 10头份/瓶 (2) 20头份/瓶 (3) 40头份/瓶 (4) 50头份/瓶 (5) 100头份/瓶

【包装】 10瓶/盒

【贮藏与有效期】 2~8℃保存，有效期为24个月。

【批准文号】

【生产企业】

仅在兽医指导下使用

(二) 猪伪狂犬病活疫苗 (HN1201-R1株) 标签

兽用

猪伪狂犬病活疫苗 (HN1201-R1株)

10 (20、40、50、100) 头份/瓶

批准文号:

批 号:

有效期至:

【作用与用途】 用于预防猪伪狂犬病。免疫期为6个月，免疫产生期为免疫后14日。

【用法与用量】 按瓶签注明头份，用专用稀释液或灭菌生理盐水稀释成1头份/ml。肌肉注射1.0ml。仔猪40~60日龄免疫1次，种猪每6个月免疫1次。

【贮藏与有效期】 2~8℃保存，有效期为24个月。

【生产企业】

仅在兽医指导下使用

三、猪伪狂犬病活疫苗 (HB-98株, 悬浮培养) 说明书和标签

(一) 猪伪狂犬病活疫苗 (HB-98株, 悬浮培养) 说明书

兽用

【兽药名称】

通用名 猪伪狂犬病活疫苗(HB-98株,悬浮培养)

商品名 无

英文名 Swine Pseudorabies Vaccine, Live (Strain HB-98, Suspension Culture)

汉语拼音 Zhu Weikuangquanbing Huoyimiao (HB-98 Zhu,Xuanfupei yang)

【主要成分与含量】 含猪伪狂犬病病毒HB-98株,每头份病毒含量不低于 $10^{5.5}$ TCID₅₀。

【性状】 黄白色至乳白色海绵状疏松团块,易与瓶壁脱离,加稀释液后迅速溶解。

【作用与用途】 用于预防猪伪狂犬病。免疫产生期为免疫后21日,免疫期为6个月。

【用法与用量】 颈部肌肉注射或滴鼻。按瓶签注明头份,用稀释液稀释为1头份/ml,每头接种1.0ml。

推荐免疫程序仔猪出生后1周内颈部肌肉注射或滴鼻接种1次;母猪产前5~6周颈部肌肉注射接种1次,所产仔猪45日龄肌肉注射接种1次。

【不良反应】 一般无可见的不良反应。

【注意事项】 (1)疫苗在运输、保存、使用过程中应防止高温、消毒剂和阳光照射。

(2)应对注射部位进行严格消毒。

(3)疫苗稀释后限2小时内用完。

(4)剩余的疫苗及用具,应经消毒处理后废弃。

【规格】 (1)10头份/瓶(2)20头份/瓶(3)50头份/瓶(4)100头份/瓶

【包装】

【贮藏与有效期】 2~8℃保存,有效期为24个月。

【批准文号】

【生产企业】

仅在兽医指导下使用

(二)猪伪狂犬病活疫苗(HB-98株,悬浮培养)标签

兽用

猪伪狂犬病活疫苗(HB-98株,悬浮培养)

10(20、50、100)头份/瓶

批准文号:

批 号:

有效期至:

【作用与用途】 用于预防猪伪狂犬病。免疫产生期为免疫后21日,免疫期为6个月。

【用法与用量】 详见说明书。

【贮藏与有效期】 2~8℃保存,有效期为24个月。

【生产企业】

仅在兽医指导下使用

四、鸡新城疫、禽流感(H9亚型)、禽腺病毒病(I群, 4型)三联灭活疫苗(La Sota株+F6株+LC株)说明书和标签

(一) 鸡新城疫、禽流感(H9亚型)、禽腺病毒病(I群, 4型)三联灭活疫苗(La Sota株+F6株+LC株)说明书

兽用

【兽药名称】

通用名 鸡新城疫、禽流感(H9亚型)、禽腺病毒病(I群, 4型)三联灭活疫苗(La Sota株+F6株+LC株)

商品名 无

英文名 Newcastle Disease, Avian Influenza (Subtype H9), Fowl Adenoviruses Disease (Group I, Serotype 4) Vaccine, Inactivated (Strain La Sota+Strain F6+Strain LC)

汉语拼音 Ji Xinchengyi, Qinliugan (H9 Yaxing), Qinxianbingdubing (I Qun, 4 Xing) Sanlian Miehuoyimiao (La Sota Zhu+F6 Zhu+LC Zhu)

【主要成分与含量】 疫苗中含灭活的鸡新城疫病毒La Sota株、H9亚型禽流感病毒F6株、禽腺病毒(I群, 4型)LC株。配苗前鸡新城疫病毒抗原含量约为 $10^{9.0}$ EID₅₀/0.1ml、H9亚型禽流感病毒抗原含量约为 $10^{9.0}$ EID₅₀/0.1ml、I群4型禽腺病毒抗原含量约为 $10^{6.0}$ TCID₅₀/0.1ml。

【性状】 乳白色均匀乳剂。

【作用与用途】 用于预防鸡新城疫、H9亚型禽流感和禽腺病毒(I群, 4型)引起的疾病。接种后21日产生免疫力, 雏鸡与产蛋鸡免疫一次的保护期为5个月, 雏鸡加强免疫后保护期为6个月。

【用法与用量】 颈部皮下或肌肉注射。建议1~4周龄首免, 开产前加强免疫, 2周龄以下鸡0.2ml/羽, 2~4周龄鸡0.3ml/羽, 4周龄以上鸡0.5ml/羽。

【不良反应】 无明显不良反应。

【注意事项】 (1) 仅用于接种健康鸡。

(2) 本品严禁冻结, 在运输过程中应避免日光直射。

(3) 如出现破损、异物或破乳分层等异常现象, 切勿使用。

(4) 接种时, 注射器具需经高压或煮沸消毒, 注射部位应用碘酊消毒。

(5) 用前摇匀, 并使疫苗恢复至室温。疫苗一旦开启, 限当日用完。

(6) 一旦误将疫苗注射到人体内, 应立即就医, 并告知医生本品含有矿物油佐剂。

(7) 用过的疫苗瓶、器具和剩余的疫苗等污染物应进行无害化处理。

【规格】

【包装】

【贮藏与有效期】 2~8℃保存, 有效期为21个月。

【批准文号】

【生产企业】

仅在兽医指导下使用

(二) 鸡新城疫、禽流感(H9亚型)、禽腺病毒病(I群, 4型)三联灭活疫苗(La Sota株+F6株+LC株)

标签

兽用

**鸡新城疫、禽流感(H9亚型)、禽腺病毒病(I群, 4型)三联灭活疫苗
(La Sota株+F6株+LC株)**

批准文号:

批 号:

有效期至:

【作用与用途】用于预防鸡新城疫、H9亚型禽流感和禽腺病毒(I群, 4型)引起的疾病。接种后21日产生免疫力, 雏鸡与产蛋鸡免疫一次的保护期为5个月, 雏鸡加强免疫后保护期为6个月。

【用法与用量】颈部皮下或肌肉注射。建议1~4周龄首免, 开产前加强免疫, 2周龄以下鸡0.2ml/羽, 2~4周龄鸡0.3ml/羽, 4周龄以上鸡0.5ml/羽。

【贮藏与有效期】2~8℃保存, 有效期为21个月。

【生产企业】

仅在兽医指导下使用

五、芪翁黄柏散说明书和标签

(一) 芪翁黄柏散说明书

兽用

【兽药名称】

通用名称: 芪翁黄柏散

商品名称:

汉语拼音: Qiweng Huangbo San

【主要成分】 黄芪、白头翁、黄柏。

【性状】 本品为浅黄色至棕黄色的粉末。

【功能与主治】 抗炎、止泻, 促生长。用于预防仔猪、生长育肥猪腹泻, 提高生长性能。

【用法与用量】 混饲: 每1kg饲料, 断奶仔猪1g, 连用2个月; 生长育肥猪0.5g, 可长期添加使用。

【不良反应】 暂未发现不良反应。

【注意事项】 可在商品饲料和养殖过程中使用。

【规格】 本品每1g相当于原生药2g。

【包装】

【贮藏】 密封, 防潮。

【有效期】 24个月

【批准文号】

【生产企业】

(二) 芪翁黄柏散标签

兽用

【兽药名称】

通用名称: 芪翁黄柏散

商品名称:

汉语拼音: Qiweng Huangbo San

【主要成分】 黄芪、白头翁、黄柏。

【性状】 本品为浅黄色至棕黄色的粉末。

【功能与主治】 抗炎、止泻, 促生长。用于预防仔猪、生长育肥猪腹泻, 提高生长性能。

【用法与用量】 混饲: 每1kg饲料, 断奶仔猪1g, 连用2个月; 生长育肥猪0.5g, 可长期添加使用。

【规格】 本品每1g相当于原生药2g。

【批准文号】

【生产日期】

【生产批号】

【有效期】至

【包装】

【贮藏】 密封, 防潮。

【生产企业】

中华人民共和国农业农村部公告

第 832 号

根据《兽药管理条例》和《兽药注册办法》规定,经审查,批准硕腾公司美国卡拉玛祖生产厂生产的马来酸奥拉替尼咀嚼片在我国注册,核发《进口兽药注册证书》,并发布上述兽药质量标准、工艺规程、说明书和标签,自发布之日起执行。

批准美国爱德士生物科技有限公司等3家公司生产的鸡传染性支气管炎病毒ELISA抗体检测试剂盒等3种兽药产品在我国再注册,核发《进口兽药注册证书》,并发布工艺规程和修订后的质量标准、说明书和标签,自发布之日起执行。此前发布的上述3种兽药质量标准、说明书和标签同时废止。

批准美国法玛威生物制品股份有限公司生产的猪支原体肺炎灭活疫苗(P株)等3种兽药产品在我国变更注册。

特此公告。

附件: 1.进口兽药注册目录

- 2.质量标准
- 3.工艺规程
- 4.说明书和标签

农业农村部
2024年9月28日

附件1

进口兽药注册目录

兽药名称	生产厂名称	国别	进口兽药注册证书号	有效期限	备注
马来酸奥拉替尼咀嚼片(3.6mg) Oclacitinib Maleate Chewable Tablets	硕腾公司美国卡拉玛祖 生产厂 Zoetis LLC, Kalamazoo, USA	美国	(2024) 外兽药证字 06号	2024.09.28 — 2029.09.27	注册
马来酸奥拉替尼咀嚼片(5.4mg) Oclacitinib Maleate Chewable Tablets			(2024) 外兽药证字07号		
马来酸奥拉替尼咀嚼片(16mg) Oclacitinib Maleate Chewable Tablets			(2024) 外兽药证字08号		

续表

兽药名称	生产厂名称	国别	进口兽药注册证书号	有效期限	备注
鸡传染性支气管炎病毒ELISA抗体检测试剂盒 Infectious Bronchitis Virus ELISA Antibody Test Kit	美国爱德士生物科有限公司 IDEXX Laboratories, Inc.	美国	(2019) 外兽药证字 92号	2024.09.28 — 2029.09.27	再注册 (进口兽药注册证书号不变)
犬瘟热、腺病毒2型、副流感、细小病毒病四联活疫苗-犬钩端螺旋体病(犬型、黄疸出血型)二价灭活疫苗-犬冠状病毒病灭活疫苗 Canine Distemper-Adenovirus Type 2-Coronavirus-Parainfluenza-Parvovirus Vaccine, Modified Live and Killed Virus, Leptospira Canicola-Icterohaemorrhagiae Bacterin	硕腾公司美国林肯厂 Zoetis Inc., Lincoln, USA	美国	(2020) 外兽药证字 26号	2024.09.28 — 2029.09.27	再注册 (进口兽药注册证书号不变)
复方酚溶液 (100g:邻苯基苯酚(C ₁₂ H ₁₀ O) 12g+对氯间甲酚(C ₇ H ₇ Cl ₃) 12g) Compound Phenols Solution	安德国际有限公司 Antec International Limited	英国	(2019) 外兽药证字 65号	2024.09.28 — 2029.09.27	再注册 (进口兽药注册证书号不变)
猪支原体肺炎灭活疫苗(P株) Swine Mycoplasma Hyopneumoniae Vaccine, Inactivated (Strain P)	美国法玛威生物制品股份有限公司Pharmgate Biologics Inc.	美国	(2021) 外兽药证字 78号	2021.12.14 — 2026.12.13	变更注册: 标签注意事项中增加“本品含有硫柳汞作为防腐剂”
猪支原体肺炎复合佐剂灭活疫苗(P株) Swine Mycoplasma Hyopneumoniae Vaccine in Compound Adjuvant, Inactivated (Strain P)	美国法玛威生物制品股份有限公司 Pharmgate Biologics Inc.	美国	(2022) 外兽药证字 26号	2022.03.14 — 2027.03.13	变更注册: 标签注意事项中增加“本品含有硫柳汞作为防腐剂”
猪圆环病毒2型、猪肺炎支原体二联灭活疫苗 (重组杆状病毒P株+P株) Porcine Circovirus Type 2, Mycoplasma Hyopneumoniae Inactivated Vaccine (Recombinant Baculovirus Strain P + Strain P)	美国法玛威生物制品股份有限公司Pharmgate Biologics Inc.	美国	(2021) 外兽药证字 67号	2021.11.09 — 2026.11.08	变更注册: 标签注意事项中增加“本品含有硫柳汞作为防腐剂”

附件2(略)

附件3(略)

附件4

说明书和标签

一、马来酸奥拉替尼咀嚼片说明书和标签

(一) 马来酸奥拉替尼咀嚼片说明书

宠物用

【兽药名称】

通用名称: 马来酸奥拉替尼咀嚼片

商品名称: 爱波克(Apoquel®)

英文名称: Oclacitinib Maleate Chewable Tablets

汉语拼音: Malaisuan Aolatini Jujue Pian

【主要成分】 马来酸奥拉替尼。

【性状】 本品为浅棕至深棕色五边形片剂, 两侧均有刻痕线, 一面分别凹刻有字母“SS”(3.6mg规格)、“MM”(5.4mg规格)、“LL”(16mg规格)的字样。

【药理作用】 **药效学** 奥拉替尼是一种合成的细胞内非受体酪氨酸激酶(JAK)抑制剂, 通过抑制多种依赖于JAK1、JAK3酶活性诱发的瘙痒、炎症细胞因子以及其他与过敏有关的细胞因子起作用。本品为非皮质类固醇或抗组胺药的免疫调节剂。

药动学 犬经口给药后, 平均最高血药浓度 C_{max} 为352ng/ml, 达峰时间 t_{max} 约1.7小时, 血浆消除半衰期 $t_{1/2}$ 为4.8小时。在10~1000ng/ml浓度范围内, 奥拉替尼的血浆蛋白结合率为66.3%~69.7%。奥拉替尼在犬体内代谢为多种代谢产物。在犬的血浆和尿液中主要为氧化代谢产物。奥拉替尼主要消除途径为代谢, 通过肾脏和胆汁清除较少。

【适应证】 用于控制犬过敏性皮炎引起的瘙痒症和特应性皮炎引起的相关症状。

【用法与用量】 以奥拉替尼计。内服: 每1kg体重, 犬0.4~0.6mg, 一日2次, 连用14日。随后一日1次维持治疗。

本品有良好的适口性, 犬能主动食用; 如不主动食用, 请辅助给药。推荐剂量所需片剂数量请参见下表, 片剂沿刻痕线一分为二。

体重范围(kg)	剂量(片)		
	3.6mg/片	5.4mg/片	16mg/片
3.0~4.4	0.5	-	-

4.5~5.9	-	0.5	-
6.0~8.9	1	-	-
9.0~13.4	-	1	-
13.5~19.9	-	-	0.5
20.0~26.9	-	2	-
27.0~39.9	-	-	1
40.0~54.9	-	-	1.5
55.0~80.0	-	-	2

【不良反应】

- 1.可能增加犬对感染(包括蠕形螨病)的敏感性,以及肿瘤恶化。
- 2.奥拉替尼给药后可能会发生腹泻(2.3%)、呕吐(2.3%)、厌食(1.4%)、嗜睡(1.8%)、多饮(1.4%)等临床表现,大多数病例继续用药后症状可自行缓解。

【注意事项】

- 1.12月龄以下或体重低于3kg的犬不得使用;育种用犬、怀孕或哺乳母犬不得使用;严重感染(如肺炎等系统性感染或全身真菌性感染)的犬不得使用。
- 2.伴有复发的严重感染、复发性蠕形螨病、肿瘤病史的犬使用本品前,应充分评估风险。
- 3.本品对免疫系统具有调节作用。
- 4.应注意监测使用本品犬的感染(包括蠕形螨)和肿瘤进展情况。
- 5.可以伴食给药或空腹给药。
- 6.尚未评价本品与糖皮质激素、环孢菌素或其他全身用免疫抑制剂的联合用药情况。
- 7.使用人员在处理药片后,立即洗手。如眼睛接触到药物,立即用水或生理盐水冲洗至少15分钟,随后就医。
- 8.避免儿童接触本品。
- 9.本品仅供犬使用。一旦发生人意外吞食,必须立刻就医并告知医生相关情况。
- 10.对马来酸奥拉替尼或任何辅料过敏的犬不得使用。
- 11.本品对犬具有适口性,为避免意外过量摄入,应将本品储存在动物无法接触的地方。
- 12.本品应储存在原包装中,防止受潮;被分割后剩余的药片,应放回原包装中,且在下次给药时使用。

【休药期】 无需制定。

【规格】 按奥拉替尼计 (1) 3.6mg (2) 5.4mg (3) 16mg

【包装】

【贮藏】 密闭保存。

【有效期】 24个月。

【进口兽药注册证号】

【生产企业】 硕腾公司美国卡拉玛祖生产厂(Zoetis LLC, Kalamazoo, USA)

地址: 2605 East Kilgore Road, Kalamazoo, Michigan, 49001, USA

(二) 马来酸奥拉替尼咀嚼片标签

宠物用

【兽药名称】

通用名称: 马来酸奥拉替尼咀嚼片

商品名称: 爱波克(Apoquel®)

英文名称: Oclacitinib Maleate Chewable Tablets

汉语拼音: Malaisuan Aolatini Jujue Pian

【主要成分】 马来酸奥拉替尼。

【性状】 本品为浅棕至深棕色五边形片剂, 两侧均有刻痕线, 一面分别凹刻有字母“SS”(3.6mg规格)、“MM”(5.4mg规格)、“LL”(16mg规格)的字样。

【适应证】 用于控制犬过敏性皮炎引起的瘙痒症和特应性皮炎引起的相关症状。

【用法与用量】 以奥拉替尼计。内服: 每1kg体重, 犬0.4~0.6mg, 一日2次, 连用14日。随后一日1次维持治疗。本品有良好的适口性, 犬能主动食用; 如不主动食用, 请辅助给药。详见说明书。

【不良反应】 详见说明书。

【注意事项】 详见说明书。

【规格】 按奥拉替尼计(1) 3.6mg (2) 5.4mg (3) 16mg

【进口兽药注册证号】

【生产日期】

【生产批号】

【有效期】 至

【休药期】 无需制定。

【包装】

【贮藏】 密闭保存。

【生产企业】 硕腾公司美国卡拉玛祖生产厂(Zoetis LLC, Kalamazoo, USA)

地址: 2605 East Kilgore Road, Kalamazoo, Michigan, 49001, USA

二、鸡传染性支气管炎病毒ELISA抗体检测试剂盒说明书和标签

(一) 鸡传染性支气管炎病毒ELISA抗体检测试剂盒说明书

兽用

【兽药名称】

通用名称: 鸡传染性支气管炎病毒ELISA抗体检测试剂盒

商品名称: 无

英文名称: Infectious Bronchitis Virus ELISA Antibody Test Kit

汉语拼音: Ji Chuanranxingzhiqiguanyan Bingdu Kangti Jianceshijihe

【主要成分与含量】

试 剂	数 量
抗原包被板	5块
羊抗鸡IgG酶标抗体 辣根过氧化物酶 (HRPO) 标记的山羊抗鸡IgG	50ml
阳性对照血清 稀释的鸡IBV抗体, 叠氮钠防腐	1.9ml
阴性对照血清 稀释的不含传染性支气管炎病毒抗体鸡血清, 叠氮钠防腐	1.9ml
样品稀释液 含有蛋白稳定剂的磷酸缓冲液, 叠氮钠防腐	235ml
TMB底物溶液 3,3',5,5' 四甲基苯 (TMB)	60ml
终止液	60ml

【性状】抗原包被板 96孔塑制微孔板, 无色透明, 干燥, 无杂质吸附。

羊抗鸡IgG酶标抗体 蓝绿色澄明液体。

阴、阳性对照血清 无色或淡黄色澄明或半透明液体。

样品稀释液 橙黄色或略带红色的澄明或半透明液体。

TMB底物溶液 无色或微黄色澄明液体。

终止液 无色澄明液体, 低温条件下可能会出现絮状沉淀。

【作用与用途】用于酶联免疫吸附试验, 检测鸡血清中的传染性支气管炎病毒抗体。

【用法与判定】按以下步骤逐步进行:

1 需要自备的器材

1.1 精确的微量移液器或连续移液器, 用来吸取5 μ l、100 μ l、200 μ l和500 μ l的液体;

1.2 微量移液器使用的吸头;

1.3 用来稀释洗涤液的500ml量筒;

1.4 适用96孔微量反应板的酶标仪;

1.5 用于稀释样本的玻璃管或塑料管;

1.6 蒸馏水或去离子水;

1.7 滴加和吸取洗涤液的装置;

1.8 吸液用的真空和控制装置。

2 样品的制备

在进行检测之前要用样品稀释液将被检样品进行500倍稀释 (如: 1 μ l的样品可以用样品稀释液稀释到500 μ l)。不同的样品要注意换吸头。样品加入抗原包被板前要将样品充分混匀。

注意: 不能稀释对照。

3 操作步骤

使用前所有试剂应恢复至室温 (20~27 $^{\circ}$ C)。试剂应轻轻旋转或振荡予以混合。

3.1 取出抗原包被板并在记录表上标记好被检样品的位置。

3.2 将100 μ l未稀释的阴性对照液加入A1孔和A2孔中。

- 3.3 将100 μ l未稀释的阳性对照液加入A3孔和A4孔中。
- 3.4 将100 μ l稀释的被检样品液加入相应的孔中。
- 3.5 室温孵育30分钟。
- 3.6 吸取各孔的液体倒入废液桶。每孔加约350 μ l的蒸馏水或去离子水进行洗板,重复3~5次。
- 3.7 每孔加100 μ l的羊抗鸡IgG酶标抗体。
- 3.8 室温下孵育30分钟。
- 3.9 重复第3.6步。
- 3.10 每孔加100 μ l的TMB底物溶液。
- 3.11 室温下孵育15分钟。
- 3.12 每孔加100 μ l的终止液。
- 3.13 酶联检测仪空气调零。
- 3.14 测定各孔于650nm波长处的吸光度OD值。

4 试验有效性判断

阳性对照平均值和阴性对照平均值的差值 >0.075 , 阴性对照平均值 ≤ 0.150 , 该检测结果判为有效。检测样品中是否含有传染性支气管炎病毒的抗体由该样品的测定值与阳性对照平均值的比例决定。阳性对照已标准化,代表鸡血清中含有显著水平抗传染性支气管炎病毒抗体。被检样品的抗体水平主要由其测定值与阳性对照测定值的比值(S/P)确定。

5 结果判定

- 5.1 S/P值小于或等于0.2, 判为阴性。
- 5.2 S/P值大于0.2, 判为阳性。

6 结果计算方法

阴性对照平均OD值($NC\bar{x}$)

$$NC\bar{x} = \frac{A1孔OD值 + A2孔OD值}{2}$$

阳性对照平均OD值($PC\bar{x}$)

$$PC\bar{x} = \frac{A3孔OD值 + A4孔OD值}{2}$$

S/P值

$$S/P = \frac{\text{每个样品两个测定孔的平均OD值} - NC\bar{x}}{PC\bar{x} - NC\bar{x}}$$

注意: IDEXX公司提供免费的数据分析软件(xChek), 用于计算平均值、S/P比值以及提供综合信息。

【注意事项】 1.处理所有的试验材料以免病毒的传播。虽然经过化学处理,抗原包被板仍可能成为

IBV的传染源。

- 2.勿用口移液。
- 3.样品和试剂盒使用的地方不要吸烟、喝水和吃东西。
- 4.TMB底物和终止液对皮肤有刺激性。
- 5.试剂盒的某些成分含有防腐剂叠氮钠。处理时需要用大量的水冲洗以免形成叠氮化铜或叠氮化铅,它们在受压时可以爆炸。注意防止该成分对酶标抗体的污染。
- 6.TMB不要暴露于强光和任何氧化剂下。使用洁净的玻璃或塑料容器处理TMB底物溶液。
- 7.所有的试剂应在2~8℃贮存。使用前恢复到室温,使用后放回2~8℃。
- 8.所有的废弃液应在丢弃前合理处理,以免污染环境。
- 9.注意防止试剂盒成分受到污染。
- 10.不要使用超过有效期限的试剂,不同批次试剂盒的成分不要混用。
- 11.操作过程中的移液、时间和洗涤必须精确。
- 12.严格遵守这些条款可以获得理想的结果。

【规格】 240份/盒

【贮藏与有效期】 2~8℃保存,有效期为12个月。

【《进口兽药注册证书》证号】

【生产企业】 美国爱德士生物科技有限公司 (IDEXX Laboratories, Inc.)

仅供兽医诊断使用

(二) 鸡传染性支气管炎病毒ELISA抗体检测试剂盒标签

兽用

鸡传染性支气管炎病毒ELISA抗体检测试剂盒

240份/盒

《进口兽药注册证书》证号:

批 号:

生产日期:

【作用与用途】用于酶联免疫吸附试验,检测鸡血清中的传染性支气管炎病毒抗体。

【用法与判定】按照产品说明书所示方法在20~27℃进行。

【贮藏与有效期】2~8℃保存,有效期为12个月。

【生产企业】美国爱德士生物科技有限公司 (IDEXX Laboratories, Inc.)

仅供兽医诊断使用

兽用

抗原包被板

96孔/板

《进口兽药注册证书》证号:

批 号:

有效期至:

【用法与判定】 详见说明书。

【贮藏与有效期】 2~8℃保存, 有效期为12个月。

仅供兽医诊断使用

兽用

羊抗鸡IgG酶标抗体

50ml/瓶

《进口兽药注册证书》证号:

批 号:

有效期至:

【用法与判定】 详见说明书。

【贮藏与有效期】 2~8℃保存, 有效期为12个月。

仅供兽医诊断使用

兽用

阴性对照血清

1.9ml/瓶

《进口兽药注册证书》证号:

批 号:

有效期至:

【用法与判定】 详见说明书。

【贮藏与有效期】 2~8℃保存, 有效期为12个月。

仅供兽医诊断使用

兽用

阳性对照血清

1.9ml/瓶

《进口兽药注册证书》证号:

批 号:

有效期至:

【用法与判定】 详见说明书。

【贮藏与有效期】 2~8℃保存, 有效期为12个月。

仅供兽医诊断使用

兽用

样品稀释液

235ml/瓶

《进口兽药注册证书》证号:

批 号:

有效期至:

【用法与判定】 详见说明书。

【贮藏与有效期】 2~8℃保存, 有效期为12个月。

仅供兽医诊断使用

兽用

TMB底物溶液

60ml/瓶

《进口兽药注册证书》证号:

批 号:

有效期至:

【用法与判定】 详见说明书。

【贮藏与有效期】 2~8℃保存, 有效期为12个月。

仅供兽医诊断使用

兽用

终止液

60ml/瓶

《进口兽药注册证书》证号:

批 号:

有效期至:

【用法与判定】 详见说明书。

【贮藏与有效期】 2~8℃保存, 有效期为12个月。

仅供兽医诊断使用

三、犬瘟热、腺病毒2型、副流感、细小病毒病四联活疫苗-犬钩端螺旋体病(犬型、黄疸出血型)二价灭活疫苗-犬冠状病毒病灭活疫苗说明书和标签

(一) 犬瘟热、腺病毒2型、副流感、细小病毒病四联活疫苗-犬钩端螺旋体病(犬型、黄疸出血型)二价灭活疫苗-犬冠状病毒病灭活疫苗说明书

兽用

【兽药名称】

通用名称: 犬瘟热、腺病毒2型、副流感、细小病毒病四联活疫苗-犬钩端螺旋体病(犬型、黄疸出血型)二价灭活疫苗-犬冠状病毒病灭活疫苗

商品名称: 卫佳®捌

英文名称: Canine Distemper-Adenovirus Type 2-Coronavirus-Parainfluenza-Parvovirus Vaccine, Modified Live and Killed Virus, *Leptospira Canicola-Icterohaemorrhagiae* Bacterin

汉语拼音: Quanwenre Xianbingduerxing Fuliugan Xixiaobingdubing Silian Huoyimiao Quanguoduanluoxuantibing (Quanxing Huangdanchuxuexing) Erjia Miehuoyimiao Quanguanzhuangbingdubing Miehuoyimiao

【主要成分与含量】 每头份疫苗中含犬瘟热病毒N-CDV致弱株至少 $10^{2.5}$ TCID₅₀; 含犬腺病毒2型Manhattan致弱株至少 $10^{2.9}$ TCID₅₀; 含犬副流感病毒NL-CPI-5株至少 $10^{5.0}$ TCID₅₀; 含犬细小病毒NL-35-D

株至少 $10^{7.0}$ TCID₅₀；犬钩端螺旋体C-51株和黄疸出血型钩端螺旋体NADL株，灭活前均应不低于600浊度单位；犬冠状病毒NL-18株抗原的相对效力单位（RP）不低于1.0。

【性状】 冻干疫苗部分为微黄色海绵状疏松团块；液体疫苗部分为澄明或轻度混浊的粉红色液体。两部分混合后，冻干团块迅速溶解。

【作用与用途】 用于预防犬瘟热、犬腺病毒1型引起的传染性肝炎、犬腺病毒2型引起的呼吸道病、犬副流感、犬细小病毒病、犬冠状病毒病，以及犬钩端螺旋体和黄疸出血型钩端螺旋体引起的钩端螺旋体病。

【用法与用量】 用液体疫苗部分溶解冻干疫苗部分。皮下或肌肉注射，每次1头份（1ml）。对6周龄或6周龄以上犬首次免疫，推荐连续接种3次，每次间隔3周。以后每年接种1次。

【不良反应】 接种疫苗后，个别犬可能出现过敏反应，此时，可用肾上腺素进行抢救，并采取适当的辅助治疗措施。

【注意事项】 1.仅用于接种健康犬；禁止接种怀孕母犬。

2.切勿冻结或长时间暴露于高温下。

3.疫苗瓶启封后，应一次用完。

4.接种时，应按常规无菌操作；注射器和针头不能使用化学方法消毒。

5.疫苗内含有庆大霉素。

6.用过的疫苗瓶、器具和未用完的疫苗等应进行无害化处理。

7.如果动物处于某些传染性疾病的潜伏期、营养不良、有寄生虫感染、处于运输或环境应激状态下或存在免疫抑制，或者未按说明书进行接种，均可能引起免疫失败。

【规格】 冻干疫苗部分：1头份/瓶；液体疫苗部分：1ml/瓶。

【包装】 25头份（50瓶）/盒

【贮藏与有效期】 2~8℃保存，有效期为18个月。

【《进口兽药注册证书》证号】

【生产企业】 硕腾公司美国林肯厂（Zoetis Inc., Lincoln, USA）

地址：601 West Cornhusker Highway, Lincoln, Nebraska, 68521, USA

仅在兽医指导下使用

（二）犬瘟热、腺病毒2型、副流感、细小病毒病四联活疫苗-犬钩端螺旋体病（犬型、黄疸出血型）二价灭活疫苗-犬冠状病毒病灭活疫苗标签

兽用

卫佳®捌

犬瘟热、腺病毒2型、副流感、细小病毒病四联活疫苗-犬钩端螺旋体病
（犬型、黄疸出血型）二价灭活疫苗-犬冠状病毒病灭活疫苗
（冻干疫苗部分）

1头份/瓶

《进口兽药注册证书》证号：

批 号：

生产日期：

详见说明书。

有效期至：

【用法与用量】 用液体疫苗部分溶解冻干疫苗部分。皮下或肌肉注射, 每次1头份(1ml)。

【贮藏与有效期】 2~8℃保存, 有效期为18个月。

【生产企业】 硕腾公司美国林肯厂(Zoetis Inc., Lincoln, USA)

仅在兽医指导下使用

兽用

卫佳®捌

犬瘟热、腺病毒2型、副流感、细小病毒病四联活疫苗-犬钩端螺旋体病

(犬型、黄疸出血型)二价灭活疫苗-犬冠状病毒病灭活疫苗

(液体疫苗部分)

1ml/瓶

《进口兽药注册证书》证号:

批 号:

生产日期:

详见说明书。有效期至:

【用法与用量】 用液体疫苗部分溶解冻干疫苗部分。皮下或肌肉注射, 每次1头份(1ml)。

【贮藏与有效期】 2~8℃保存, 有效期为18个月。

【生产企业】 硕腾公司美国林肯厂(Zoetis Inc., Lincoln, USA)

仅在兽医指导下使用

四、复方酚溶液说明书和标签

(一) 复方酚溶液说明书

兽用 外用

【兽药名称】

通用名称: 复方酚溶液

商品名称: 卫可浩普® (Virkon® LSP)

英文名称: Compound Phenols Solution

汉语拼音: Fufangfen Rongye

【主要成分】 邻苯基苯酚和对氯间甲酚

【性状】 本品为澄清至略微浑浊的棕黄色至绿褐色液体, 有时含少许沉淀; 有醋酸味和酚味。

【药理作用】 邻苯基苯酚、对氯间甲酚通过使菌体蛋白凝固变性而呈现杀菌作用。碱性环境、脂类和皂类等能减弱其杀菌作用。对动物和人有较强毒性, 不能用于创面和皮肤的消毒。

【用途】 用于动物圈舍表面、器具、设备的消毒。

【用法与用量】 稀释后喷雾使用, 每1平方米用量300ml。稀释比例: 动物圈舍表面1: 200; 器具设备1: 400。疾病发生时, 禽流感病毒和新城疫病毒1: 200; 猪蓝耳病病毒1: 400; 大肠杆菌1: 400; 支原体、沙门氏菌1: 200。

【不良反应】 按规定的用法用量使用, 暂未见不良反应。

【注意事项】 1.使用前务必仔细阅读说明书,安全使用消毒剂。

2.畜舍消毒前将所有牲畜转移他处;消毒前需清洗设备。

3.仅限专业人员使用。穿戴个人防护服、防水服、手套、靴子和面部保护罩,避免吸入喷雾(在使用过程中始终佩戴防雾呼吸器),避免本产品接触到眼睛和皮肤。若食入,禁止催吐,漱口并喝少量水,立即就医;若皮肤接触,立即脱掉被污染衣物,用水冲洗皮肤;若吸入,转移至新鲜空气中并保持呼吸顺畅,立即就医;若进入眼睛,立即用大量水冲洗并就医。未经防护的人员不得进入被处理的区域,直到喷雾散去。

4.本品可能腐蚀金属;对水生生物有毒并具有长期持续影响。

5.本品不适用于牛奶生产/处理设备,可能有污染牛奶的风险。

6.在某些贮存条件下,产品可能有少量沉淀物。按说明书使用,沉淀物不影响产品的性能。

7.使用后务必用干净水冲洗所用设备。

8.本产品勿直接排放到水道。处置时应符合环境保护、废弃物处理法规和当地相关法规的要求。

9.未使用的稀释产品可常温贮藏一周。

【休药期】 无需制定

【规格】 100g:邻苯基苯酚(C₁₂H₁₀O) 12g+对氯间甲酚(C₇H₇ClO) 12g

【包装】 (1) 1L/桶(2) 5L/桶(3) 20L/桶

【贮藏】 密封,在凉暗处保存。

【有效期】 24个月

【进口兽药注册证号】

【生产企业】 安德国际有限公司(Antec International Limited)

地址: Windham Road, Chilton Industrial Estate, Sudbury, Suffolk, CO10 2XD, United Kingdom

(二) 复方酚溶液标签

兽用 外用

【兽药名称】

通用名称: 复方酚溶液

商品名称: 卫可浩普® (Virkon® LSP)

英文名称: Compound Phenols Solution

汉语拼音: Fufangfen Rongye

【主要成分】 邻苯基苯酚和对氯间甲酚

【性状】 本品为澄清至略微浑浊的棕黄色至绿褐色液体,有时含少许沉淀;有醋酸味和酚味。

【用途】 用于动物圈舍表面、器具、设备的消毒。

【规格】 100g:邻苯基苯酚(C₁₂H₁₀O) 12g+对氯间甲酚(C₇H₇ClO) 12g

【进口兽药注册证号】

【生产日期】

【生产批号】

【有效期】至

【休药期】 无需制定

【贮藏】 密封, 在凉暗处保存。

【包装】

【生产企业】 安德国际有限公司 (Antec International Limited)

地址: Windham Road, Chilton Industrial Estate, Sudbury, Suffolk, CO10 2XD, United Kingdom

中华人民共和国农业农村部公告

第 835 号

根据《兽药管理条例》和《兽药注册办法》规定, 经审查, 批准格格巫(珠海)生物科技有限公司等42家单位申报的礼舒替尼等9种兽药产品为新兽药, 核发《新兽药注册证书》, 发布产品工艺规程、质量标准、说明书和标签, 自发布之日起执行。

批准内蒙古圣雪大成制药有限公司申报的金霉素预混剂兽药产品变更注册, 发布修订后的说明书和标签, 自发布之日起执行; 批准中国农业科学院兰州兽医研究所等5家单位申报的口蹄疫O型、A型二价灭活疫苗(O/MYA98/BY/2010株+Re-A/WH/09株)等3种兽药产品变更注册, 申请人按照农业农村部批准的变更事项, 自行修改原批准的说明书和标签对应内容, 并印制、使用。

特此公告。

- 附件: 1.新兽药注册目录
2.兽药变更注册目录
3.工艺规程
4.质量标准
5.说明书和标签

农业农村部

2024年10月15日

附件1

新兽药注册目录

新兽药名称	研制单位	类别	新兽药注册证书号	监测期
礼舒替尼	格格巫(珠海)生物科技有限公司、礼蓝(上海)动物保健有限公司、礼蓝(四川)动物保健有限公司	一类	(2024) 新兽药证字52号	5年
礼舒替尼片	格格巫(珠海)生物科技有限公司、礼蓝(上海)动物保健有限公司、礼蓝(四川)动物保健有限公司	一类	(2024) 新兽药证字53号	5年
禽白血病病毒AB亚群ELISA抗体检测试剂盒	中国农业科学院哈尔滨兽医研究所、哈尔滨国生生物科技股份有限公司、哈尔滨维科生物技术有限公司、浙江东方基因生物制品股份有限公司	二类	(2024) 新兽药证字54号	4年
缩宫素	宁波第二激素厂、宁波舒生生物科技有限公司	三类	(2024) 新兽药证字55号	3年
迎甘口服液	河北地邦动物保健科技有限公司、四川省川龙动科药业有限公司、四川育强科技有限公司、四川好益特动物保健药品有限公司、四川省泰信动物药业有限公司、河北维尔利生物科技有限公司、广东广牧动物保健品有限公司、河北旭泓动物药业有限公司、四川育强本草生物技术有限公司、四川省畜牧科学研究院、四川省兽药监察所、四川农业大学、山东省农业科学院畜牧兽医研究所	三类	(2024) 新兽药证字56号	3年
川贝止咳胶囊	北京生泰尔科技股份有限公司、爱迪森(北京)生物科技有限公司、中国农业大学、生泰尔(内蒙古)科技有限公司、北京爱宠族科技有限公司、爱宠族(江苏)科技有限公司	三类	(2024) 新兽药证字57号	3年
猪伪狂犬病灭活疫苗(C1201/ Δ gE株)	国药集团动物保健股份有限公司、中国农业大学、上海创宏生物科技有限公司	三类	(2024) 新兽药证字58号	3年
禽白血病病毒化学发光抗原检测试剂盒	中国农业科学院哈尔滨兽医研究所、哈尔滨维科生物技术有限公司、洛阳现代生物技术研究院有限公司、洛阳莱普生信息科技有限公司、深圳市绿诗源生物技术有限公司	三类	(2024) 新兽药证字59号	3年
复方硝酸咪康唑洗剂	北京塞尔斯医药科技有限公司、河北圣雪大成唐山制药有限责任公司、江苏南京农大动物药业有限公司盱眙分公司、北京中农劲腾生物制药股份有限公司、四川恒通动保生物科技有限公司、江苏农牧科技职业学校、杭州塞尔斯医药科技有限公司、江苏中牧倍康药业有限公司、北京中农劲腾生物技术股份有限公司	五类	(2024) 新兽药证字60号	3年

附件2

兽药变更注册目录

兽药名称	申请单位	兽药标准来源	变更事项	监测期 (针对变更事项)
金霉素预混剂	内蒙古圣雪大成制药有限公司	农业农村部第246号 同品种相应内容	增加靶动物绵羊羔羊	3年
口蹄疫O型、A型二价灭活疫苗(O/MYA98/BY/2010株+Re-A/WH/09株)	中国农业科学院兰州兽医研究所、金宇保灵生物药品有限公司、中农威特生物科技股份有限公司	(2013) 新兽药证字 40号	有效期由12个月变更为18个月	/
注射用头孢噻唑钠	艾美科健(中国)生物医药有限公司	《中国兽药典》2020年版(一部)同品种相应内容	在0.2g、0.5g规格的基础上增加10.0g规格	/
注射用促黄体素释放激素A ₂	宁波第二激素厂	《兽药质量标准》(2017年版)化学药品卷同品种相应内容	在25μg、50μg、0.125mg规格的基础上增加1.25mg规格	/

附件3(略)

附件4(略)

附件5

说明书和标签

一、礼舒替尼标签

兽用

【兽药名称】

通用名称：礼舒替尼

英文名称：Lirucitinib

汉语拼音：Lishutini

【包装规格】

【生产日期】

【生产批号】
【有效期】至
【运输注意事项】遮光
【贮藏】遮光,密封保存。
【批准文号】
【生产企业】

二、礼舒替尼片说明书和标签

(一) 礼舒替尼片说明书

宠物用

【兽药名称】

通用名称: 礼舒替尼片

商品名称:

英文名称: Lirucitinib Tablets

汉语拼音: Lishutini Pian

【主要成分】 礼舒替尼

【性状】 本品为薄膜衣刻痕片,除去包衣后呈白色或类白色。

【药理作用】 **药效学** 礼舒替尼是一种人工合成的JAKs激酶抑制剂,可阻断JAK-STAT信号传导通路,通过抑制多种依赖于JAK1酶活性的诱发瘙痒、炎症的细胞因子以及与过敏有关的细胞因子起作用。

药动学 犬经口服给药后,药物吸收迅速、良好。犬的进餐状态对吸收速率或吸收程度无显著影响。药物口服绝对生物利用度为93.57%,1~2小时达峰,峰浓度约为637ng/ml,与犬血浆蛋白结合率低,为41.8%。静脉注射后的分布容积约为603ml/kg,分布广泛。口服给药和静脉注射的消除半衰期相似,约为4~6小时,主要以原药形式经尿液排出体外,部分药物在犬体内代谢为多种代谢物,以氧化代谢为主,但代谢物含量低。药物对主要CYP酶无明显抑制作用,通过竞争抑制引起药物相互作用的潜力低。

【适应证】 用于控制犬过敏性瘙痒。

【用法与用量】 以礼舒替尼计。内服:每1kg体重,犬0.5~1.0mg,一日2次,连用14日。

【不良反应】 暂未发现。

【注意事项】 1. 可以伴食给药或空腹给药。

2. 对使用本品的犬应监测感染的发展,包括蠕形螨病和肿瘤。

3. 对育种、怀孕哺乳犬未进行研究。

4. 该药物不属于皮质类固醇或抗组胺药。没有评价过本品与糖皮质激素或其他全身用免疫抑制剂的联合用药。

5. 人员在处理药片后,立即洗手。如眼睛接触到药物,立即用水或生理盐水冲洗至少15分钟,随后就医。

6. 避免儿童接触本品。

7. 一旦有人员意外吞食,必须立刻就医并告知医生相关情况。

- 【休药期】 无需制定
- 【规格】 按礼舒替尼计, 10 mg
- 【包装】 口服固体高密度聚乙烯瓶, (1) 30 片/瓶 (2) 90 片/瓶
- 【贮藏】 遮光, 密封, 25℃以下保存
- 【有效期】 24 个月
- 【批准文号】
- 【生产企业】

(二) 礼舒替尼片标签

宠物用

【兽药名称】

通用名称: 礼舒替尼片
商品名称:
英文名称: Lirucitinib Tablets
汉语拼音: Lishutini Pian

【主要成分】 礼舒替尼

【性状】 本品为薄膜衣刻痕片, 除去包衣后呈白色或类白色。

【适应证】 用于控制犬过敏性瘙痒。

【用法与用量】 以礼舒替尼计。内服: 每 1 kg 体重, 犬 0.5~1.0 mg, 一日 2 次, 连用 14 日。

【规格】 按礼舒替尼计, 10 mg

【批准文号】

【生产日期】

【生产批号】

【有效期】 至

【休药期】 无需制定

【包装】 口服固体高密度聚乙烯瓶, (1) 30 片/瓶, (2) 90 片/瓶

【贮藏】 遮光, 密封, 25℃以下保存

【生产企业】

三、禽白血病病毒 AB 亚群 ELISA 抗体检测试剂盒说明书和标签

(一) 禽白血病病毒 AB 亚群 ELISA 抗体检测试剂盒说明书

兽用

【兽药名称】

通用名 禽白血病病毒AB 亚群 ELISA 抗体检测试剂盒
商品名 无
英文名 Avian Leukosis Virus Subgroup AB ELISA Antibody Test Kit

汉语拼音 Qinbaixuebing Bingdu ABYaqun ELISA Kangtijiance Shijihe

【主要成分与含量】试剂盒中含有如下成分：

试剂盒组成	数量	规格
抗原包被板	1块/盒或5块/盒	96孔/块
阴性对照血清	1管/盒	1ml/管或3ml/管
阳性对照血清	1管/盒	1ml/管或3ml/管
样品稀释液	1瓶/盒	50ml/瓶或250ml/瓶
10倍浓缩洗涤液	1瓶/盒	15ml/瓶或75ml/瓶
兔抗鸡IgG酶标抗体	1瓶/盒	10ml/瓶或50ml/瓶
底物溶液	1瓶/盒	10ml/瓶或50ml/瓶
终止液	1瓶/盒	10ml/瓶或50ml/瓶
说明书		1份/盒

【性状】试剂盒应无破损、无裂痕、无渗漏。其中：

抗原包被板 包装袋封闭良好，表面光洁、无裂纹、包被板孔底清洁、透明、无异物。

阳性对照血清 无色或淡黄色澄清液体。

阴性对照血清 无色或淡黄色澄清液体。

样品稀释液 无色澄清液体。

10倍浓缩洗涤液 无色澄清液体。

兔抗鸡IgG酶标抗体 无色或淡黄色澄清液体。

底物溶液 无色或淡蓝色澄清液体。

终止液 无色澄清液体。

【作用与用途】用于检测鸡血清中禽白血病病毒A亚群和B亚群抗体。

【用法与判定】

1 用法

1.1 试剂的准备 用前将所有的试剂和样品恢复至 15~30℃，试剂应轻轻地旋转或振荡予以混合。

1.2 洗涤液的配制 取1份10倍浓缩洗涤液加入到9份双蒸水中，混匀。配制好的洗涤液应在3日内用完。

1.3 待检血清的稀释 用样品稀释液将待检血清按 1:500 (v/v) 进行稀释。

1.4 操作步骤

1.4.1 加样 根据待检样品数量，取可拆卸包被板，平放桌面，加入稀释好的待检血清，100μl/孔，同时设阳性对照血清和阴性对照血清各 2 孔。

1.4.2 孵育 置 37℃温箱孵育 30 分钟。

1.4.3 洗涤 甩去孔内液体，加入洗涤液，250μl/孔，洗涤 3 次，每次静置 2 分钟，甩去孔内液体，拍干。

1.4.4 加入酶标抗体 加入兔抗鸡 IgG 酶标抗体, 100 μ l/孔。

1.4.5 孵育 置 37 $^{\circ}$ C 温箱孵育 30 分钟。

1.4.6 洗涤 方法同 1.4.3 项。

1.4.7 显色 加入底物溶液, 100 μ l/孔, 置 15~25 $^{\circ}$ C 避光孵育 15 分钟。

1.4.8 终止 加入终止液, 100 μ l/孔, 轻微振荡混合均匀。

1.4.9 读数 在加入终止液后 15 分钟内, 将包被板置于酶标仪中, 在波长为 450nm 下读取 OD_{450nm} 值。

1.4.10 计算 按下式计算 S/P 值。

$$S/P \text{ 值} = \frac{\text{待检样品 OD}_{450\text{nm}} \text{ 值} - \text{阴性对照血清平均 OD}_{450\text{nm}} \text{ 值}}{\text{阳性对照血清平均 OD}_{450\text{nm}} \text{ 值} - \text{阴性对照血清平均 OD}_{450\text{nm}} \text{ 值}}$$

2 试验成立的条件 0.60 $\leq$ 阳性对照血清 OD_{450nm} 值 $\leq$ 1.30, 阴性对照血清 OD_{450nm} 值 $<$ 0.10, 则判为试验成立。

3 判定 待检样品 S/P 值 $\geq$ 0.20, 判为阳性; 待检样品 S/P 值 $<$ 0.20, 判为阴性。

【注意事项】 (1) 试剂盒应在 2~8 $^{\circ}$ C 运输及保存。

(2) 贮藏时, 所有的板条一定要用封口膜密封, 防止潮气对包被板的损伤。否则, 不得使用。

(3) 不要使底物溶液接触强光和氧化物。所有试剂取出后, 均不得再加回瓶中。

(4) 仔细阅读说明书。

(5) 不要使用过期的组分或者不同批次试剂混合使用。

(6) 10 倍浓缩洗涤液如发现结晶, 稀释前置 37 $^{\circ}$ C 使其溶解后再使用。

(7) 注意加样和洗涤过程, 应确保试验的准确度, 严禁用嘴吸液。

(8) 待检血清发生腐败时勿用于检测。

(9) 检验用器皿必须清洁, 操作过程避免与金属类器物接触。

(10) 应严格按照试剂盒说明书进行操作, 严格遵守各操作步骤规定的时间和温度。

(11) 操作过程中使用手套, 终止液是硫酸, 具有腐蚀性, 使用时要小心。所有的废液要经过无害化处理和净化。

【规格】 (1) 1 个 96 孔板/盒 (2) 5 个 96 孔板/盒。

【贮藏与有效期】 2~8 $^{\circ}$ C 保存, 有效期为 12 个月。

【批准文号】

【生产企业】

仅供兽医诊断使用

(二) 禽白血病病毒 AB 亚群 ELISA 抗体检测试剂盒内包装标签

兽用

禽白血病病毒 AB 亚群 ELISA 抗体检测试剂盒

1 (5) 个 96 孔板/盒

批准文号:

批 号:

有效期至:

【用法与判定】 详见说明书。

【贮藏与有效期】 2~8℃保存, 有效期为 12 个月。

【生产企业】

仅供兽医诊断使用

兽用

抗原包被板

96 孔/块

批 号:

有效期至:

【用法与判定】 详见说明书。

【贮藏与有效期】 2~8℃保存, 有效期为 12 个月。

【生产企业】

仅供兽医诊断使用

兽用

阴性对照血清

1 (3) ml/管

批 号:

有效期至:

【用法与判定】 详见说明书。

【贮藏与有效期】 2~8℃保存, 有效期为 12 个月。

【生产企业】

仅供兽医诊断使用

兽用

阳性对照血清

1 (3) ml/管

批 号:

有效期至:

【用法与判定】 详见说明书。

【贮藏与有效期】 2~8℃保存, 有效期为 12 个月。

【生产企业】

仅供兽医诊断使用

兽用

样品稀释液

50 (250) ml/瓶

批 号:

有效期至:

【用法与判定】 详见说明书。

【贮藏与有效期】 2~8℃保存, 有效期为 12 个月。

【生产企业】

仅供兽医诊断使用

兽用

10 倍浓缩洗涤液

15 (75) ml/瓶

批 号:

有效期至:

【用法与判定】 详见说明书。

【贮藏与有效期】 2~8℃保存, 有效期为 12 个月。

【生产企业】

仅供兽医诊断使用

兽用

兔抗鸡 IgG 酶标抗体

10 (50) ml/瓶

批 号:

有效期至:

【用法与判定】 详见说明书。

【贮藏与有效期】 2~8℃保存, 有效期为 12 个月。

【生产企业】

仅供兽医诊断使用

兽用

底物溶液

10 (50) ml/瓶

批 号:

有效期至:

【用法与判定】 详见说明书。

【贮藏与有效期】 2~8℃保存, 有效期为 12 个月。

【生产企业】

仅供兽医诊断使用

兽用

终止液

10 (50) ml/瓶

批 号:

有效期至:

【用法与判定】 详见说明书。

【贮藏与有效期】 2~8℃保存, 有效期为 12 个月。

【生产企业】

仅供兽医诊断使用

四、缩宫素标签

兽用

【兽药名称】

通用名称: 缩宫素

英文名称: Oxytocin

汉语拼音: Suogongsu

【包装规格】

【生产日期】

【生产批号】

【有效期】 至

【运输注意事项】 防潮、防晒。

【贮藏】 遮光, 密封, 冷处保存。

【批准文号】

【生产企业】

五、迎甘口服液说明书和标签

(一) 迎甘口服液说明书

兽用

【兽药名称】

通用名称: 迎甘口服液

商品名称:

汉语拼音: Yinggan Koufuye

【主要成分】 满山红、桔梗、炙甘草。

【性状】 本品为棕色至棕褐色的液体, 久置有少许沉淀。

【功能与主治】 宣肺、止咳、祛痰。用于治疗猪肺热咳嗽。证见发热咳嗽、精神萎靡、鼻流黏涕或脓涕。

【用法与用量】 混饮: 每 1kg 体重, 猪 0.3ml, 每日一次, 连用 7 日。

【不良反应】 按规定剂量使用, 暂未见不良反应。

【注意事项】 本品性状改变时禁用。

【规格】 每 1ml 相当于原生药 0.917g。

【包装】

【贮藏】密封
【有效期】24个月
【批准文号】
【生产企业】

(二)迎甘口服液标签

兽用

【兽药名称】

通用名称:迎甘口服液

商品名称:

汉语拼音:Yinggan Koufuye

【主要成分】满山红、桔梗、炙甘草。

【性状】本品为棕色至棕褐色的液体,久置有少许沉淀。

【功能与主治】宣肺、止咳、祛痰。用于治疗猪肺热咳嗽。证见发热咳嗽、精神萎靡、鼻流黏涕或脓涕。

【用法与用量】混饮:每1kg体重,猪0.3ml,每日一次,连用7日。

【规格】每1ml相当于原生药0.917g。

【包装】

【贮藏】密封

【生产日期】

【生产批号】

【有效期】至

【批准文号】

【生产企业】

六、川贝止咳胶囊说明书和标签

(一)川贝止咳胶囊说明书

宠物用

【兽药名称】

通用名称:川贝止咳胶囊

商品名称:

汉语拼音:Chuanbei Zhike Jiaonang

【主要成分】川贝母、枇杷叶、百部、前胡、桔梗、桑白皮等。

【性状】本品为硬胶囊,内容物为淡黄色至棕黄色的粉末。

【功能与主治】止嗽祛痰。主治犬风热咳嗽。

【用法与用量】口服:一次量,每1kg体重,犬60mg~120mg,一日2次,连用7日。或根据体重按下表

推荐用量使用。

体重 (kg)	≤5	>5~10	>10~15	>15~20	>20~25	>25~30	>30~35	>35~40
一次量	1粒	2粒	3粒	4粒	5粒	6粒	7粒	8粒

【不良反应】 暂未发现不良反应。

【注意事项】 暂无规定。

【规格】 每粒装 0.3g (相当于原生药 0.768g)。

【包装】

【贮藏】 密封

【有效期】 24 个月

【批准文号】

【生产企业】

(二)川贝止咳胶囊标签

宠物用

【兽药名称】

通用名称: 川贝止咳胶囊

商品名称:

汉语拼音: Chuanbei Zhike Jiaonang

【主要成分】 川贝母、枇杷叶、百部、前胡、桔梗、桑白皮等。

【性状】 本品为硬胶囊, 内容物为淡黄色至棕黄色的粉末。

【功能与主治】 止咳祛痰。主治犬风热咳嗽。

【用法与用量】 口服: 一次量, 每 1kg 体重, 犬 60mg~120mg, 一日2 次, 连用7日。或根据体重按下表推荐用量使用。

体重 (kg)	≤5	>5~10	>10~15	>15~20	>20~25	>25~30	>30~35	>35~40
一次量	1粒	2粒	3粒	4粒	5粒	6粒	7粒	8粒

【规格】 每粒装 0.3g (相当于原生药 0.768g)。

【批准文号】

【生产日期】

【生产批号】

【有效期】 至

【包装】

【贮藏】 密封

【生产企业】

七、猪伪狂犬病灭活疫苗(C1201/ Δ gE 株)说明书和标签

(一)猪伪狂犬病灭活疫苗(C1201/ Δ gE 株)说明书

兽用

【兽药名称】

通用名称 猪伪狂犬病灭活疫苗(C1201/ Δ gE 株)

商品名称 无

英文名称 Swine Pseudorabies Vaccine, Inactivated (Strain C1201/ Δ gE)

汉语拼音 Zhu Weikuangquanbing Miehuoyimiao (C1201/ Δ gE Zhu)

【主要成份与含量】 疫苗中含有灭活的猪伪狂犬病基因缺失病毒(C1201/ Δ gE 株),灭活前的病毒含量为 $10^{8.0}$ TCID₅₀/ml。

【性状】 久置后有少量沉淀,振摇后呈淡粉色或白色均匀混悬液。

【作用与用途】 用于预防猪伪狂犬病。免疫产生期为一免后 28日,免疫期为6个月。

【用法与用量】 颈部肌肉注射。仔猪在 3~4周龄接种 2.0ml,14日后以同剂量加强接种 1次。母猪在产前7~8周接种 4.0ml,14日后以同剂量加强接种 1次。

【不良反应】 一般无可见的不良反应。

【注意事项】 (1)本品仅用于接种健康猪。

(2)疫苗应避光保存,切忌冻结,冻结过的疫苗严禁使用。

(3)使用前,应将疫苗恢复至室温,并充分摇匀。

(4)接种时,应作局部消毒处理。

(5)用过的疫苗瓶、器具和未用完的疫苗等应进行无害化处理。

【规格】

【包装】

【贮藏与有效期】 2~8℃保存,有效期为 24个月。

【生产企业】

仅在兽医指导下使用

(二)猪伪狂犬病灭活疫苗(C1201/ Δ gE 株) 内包装标签

兽用

猪伪狂犬病灭活疫苗(C1201/ Δ gE 株)

批准文号:

批 号:

有效期至:

【作用与用途】 用于预防猪伪狂犬病。免疫产生期为一免后 28日,免疫期为 6个月。

【用法与用量】 颈部肌肉注射。仔猪在 3~4周龄接种 2.0ml,14日后以同剂量加强接种 1次。母猪在产前7~8周接种 4.0ml,14日后以同剂量加强接种 1次。

【贮藏与有效期】 2~8℃保存,有效期为 24个月。

【生产企业】

仅在兽医指导下使用

八、禽白血病病毒化学发光抗原检测试剂盒说明书和标签

(一) 禽白血病病毒化学发光抗原检测试剂盒说明书

兽用

【产品名称】

通用名称: 禽白血病病毒化学发光抗原检测试剂盒

商品名称:

汉语拼音: QinbaixuebingBingdu Huaxuefaguang Kangyuan Jiance Shijihe

英文名称: CLIA Kit to Detect Antigen of Avian Leukosis

【主要组成成分】

组分名称	数量		
CLIA 包被板	96 孔×1 板	96 孔×2 板	96 孔×5 板
酶结合物	12ml×1 瓶	24ml×1 瓶	60ml×1 瓶
阳性对照	0.5ml×1 瓶	1ml×1 瓶	2.5ml×1 瓶
阴性对照	0.5ml×1 瓶	1ml×1 瓶	2.5ml×1 瓶
发光底物 A	6ml×1 瓶	12ml×1 瓶	30ml×1 瓶
发光底物 B	6ml×1 瓶	12ml×1 瓶	30ml×1 瓶
固体洗液	5g×1 包	5g×2 包	5g×5 包
加样槽	1 个	2 个	5 个
封板膜	2 张	4 张	10 张
说明书	1 份	1 份	1 份

【作用与用途】 用于检测禽类蛋清或泄殖腔拭子等样品中的禽白血病病毒 P27 抗原。

【用法与判定】

1 用法

1.1 样品处理

1.1.1 蛋清样品处理 取全蛋, 破碎出小孔后, 通过小孔直接吸取 100 μ l 蛋清加到 CLIA 包被板中。1.1.2 泄殖腔拭子样品处理 取灭菌棉签于待检禽泄殖腔取样后, 放入 1ml (0.01mol/L, pH 值 7.2) PBS 溶液中, 置-20 $^{\circ}$ C以下冰箱中冻融一次, 使用前恢复至室温, 离心后取 100 μ l 上清加到 CLIA包被板中进行检测。1.2 平衡 将试剂盒从冷藏环境中取出, 置室温平衡至 15~25 $^{\circ}$ C后使用, 液体试剂用前轻轻旋转或震

荡混匀。

1.3 洗涤液配制 用纯化水或去离子水溶解固体洗液(每包固体洗液加 500ml 水)。

1.4 操作步骤

1.4.1 加样 取出 CLIA 包被板(根据待检样品的量,可将板条拆开分次使用),依次加入阳性对照、阴性对照各 100 μ l/孔,每次检测各加两孔;在相应的样品孔中按 100 μ l/孔加入样品。

1.4.2 孵育 贴上封板膜,置 37 $\pm$ 2 $^{\circ}$ C 恒温培养箱中孵育 30 分钟($\pm$ 1 分钟)。

1.4.3 洗板 取出反应板,弃去反应液。用 300 μ l 洗涤液洗涤板孔,共洗涤 5 次。每次洗涤后应弃去孔内的液体。在最后一次洗涤液弃去后,将孔中残留的洗涤液在吸水纸上拍干。

1.4.4 加酶 每孔加入 100 μ l 酶结合物。

1.4.5 孵育 贴上封板膜,置 37 $\pm$ 2 $^{\circ}$ C 恒温培养箱中孵育 30 分钟($\pm$ 1 分钟)。

1.4.6 重复步骤 1.4.3。

1.4.7 加入底物 按 50 μ l/孔依次加入发光底物 A、发光底物 B,震荡混匀,在 15~25 $^{\circ}$ C 条件下避光静置 5 分钟($\pm$ 1 分钟)。

1.4.8 读值 在化学发光仪上读取发光值。

2 结果判定

2.1 试验成立条件 阳性对照均值($PC \bar{X}$) = (PC1+PC2)/2; 阴性对照均值($NC \bar{X}$) = (NC1+NC2)/2。当阳性对照(发光值)均值($PC \bar{X}$) > 6000, 且 $PC \bar{X}/NC \bar{X} > 100$, 阴性对照(发光值)均值($NC \bar{X}$) < $PC \bar{X} \times 10^{-2}$ 时, 试验成立; 否则, 试验不成立。

2.2 结果判定 $S/P = S/PC \bar{X}$, 其中 S 代表样品发光值。若 $S/P \geq 0.2$, 样品应判定为阳性; 若 $S/P < 0.2$, 样品应判定为阴性。

【注意事项】

1. 为使您的实验获得正确结果, 请您在实验前仔细阅读本说明书。
2. 所有试剂使用前应恢复至室温(15~25 $^{\circ}$ C), 以免温度过低影响检测结果。
3. 实验前应使用温度计检测温箱温度, 温度过高或过低影响发光值。
4. 包被板温育时严禁堆叠放置, 应该平铺且板间有空隙, 不要离温箱壁太近。
5. 实验所用移液器及设备应定期校准。
6. 所有需要现场配制的试剂都限于当日现配现用, 隔夜不可再用。

【规格】 (1)1 板/盒 (2)2 板/盒 (3)5 板/盒。

【贮藏与有效期】 2~8 $^{\circ}$ C 保存, 有效期为 12 个月。

【批准文号】

【生产企业】

仅供兽医诊断使用

(二) 禽白血病病毒化学发光抗原检测试剂盒内包装标签

禽白血病病毒化学发光抗原检测试剂盒

兽用

1(2、5)板/盒

批准文号:

批 号:

有效期至:

【作用与用途】用于检测禽类蛋清或泄殖腔拭子等样品中的禽白血病病毒 P27 抗原。

【用法与判定】详见说明书。

【贮藏与有效期】2~8℃保存,有效期为 12 个月。

【生产企业】

仅供兽医诊断使用

CLIA 包被板

兽用

96 孔/板

批 号:

有效期至:

【用法与判定】详见说明书。

【贮藏与有效期】2~8℃保存,有效期为 12 个月。

【生产企业】

仅供兽医诊断使用

阴性对照

兽用

0.5(1、2.5) ml/瓶

批 号:

有效期至:

【用法与判定】详见说明书。

【贮藏与有效期】2~8℃保存,有效期为 12 个月。

【生产企业】

仅供兽医诊断使用

阳性对照

兽用

0.5(1、2.5) ml/瓶

批 号:

有效期至:

【用法与判定】详见说明书。

【贮藏与有效期】2~8℃保存,有效期为 12 个月。

【生产企业】

仅供兽医诊断使用

酶结合物

兽用

12 (24、60) ml/瓶

批 号:

有效期至:

【用法与判定】 详见说明书。

【贮藏与有效期】 2~8℃保存, 有效期为 12 个月。

【生产企业】

仅供兽医诊断使用

发光底物 A

兽用

6 (12、30) ml/瓶

批 号:

有效期至:

【用法与判定】 详见说明书。

【贮藏与有效期】 2~8℃保存, 有效期为 12 个月。

【生产企业】

仅供兽医诊断使用

发光底物 B

兽用

6 (12、30) ml/瓶

批 号:

有效期至:

【用法与判定】 详见说明书。

【贮藏与有效期】 2~8℃保存, 有效期为 12 个月。

【生产企业】

仅供兽医诊断使用

九、复方硝酸咪康唑洗剂说明书和标签

(一) 复方硝酸咪康唑洗剂说明书

宠物用 外用

【兽药名称】

通用名称: 复方硝酸咪康唑洗剂

商品名称:

英文名称: Compound Miconazole Nitrate Shampoo

汉语拼音: Fufang Xiaosuan Mikangzuo Xiji

【主要成分】 硝酸咪康唑、葡萄糖酸氯己定

【性状】 本品为微黄色至黄色黏稠澄清液体。

【药理作用】 硝酸咪康唑为广谱抗真菌药,其作用机制是抑制真菌细胞膜的合成,以及影响其代谢过程,对皮肤癣菌、念珠菌等有抗菌作用,对某些革兰阳性球菌也有一定疗效。葡萄糖酸氯己定为阳离子型表面活性防腐剂,具有广谱抗菌作用,其作用机制是改变细菌细胞膜的通透性。

【适应证】 用于治疗和控制犬由犬小孢子菌、厚皮马拉色菌和中间葡萄球菌引起的脂溢性皮炎。

【用法与用量】 外用:每1kg体重,犬1~2ml,视被毛厚度而定。每周2次,直到皮肤患处症状消退,然后每周1次或根据病情控制需要使用。用干净的水彻底浸湿毛皮,将本品涂在全身多处,按摩至被毛和皮肤上并产生泡沫,确保嘴唇周围、尾巴下方和脚趾之间能充分接触香波。静置10分钟,然后用清水冲洗干净,在温暖、通风环境中自然风干。

【不良反应】

1. 对皮肤和眼有轻度刺激性。
2. 可能会引起瘙痒、发红等轻度皮肤反应。

【注意事项】

1. 仅限于外用。
2. 如不慎入眼,用大量清水冲洗;如刺激持续存在,请咨询医生。
3. 避免动物在洗发或毛发干燥前舔舐;避免动物在洗发过程中通过鼻子和嘴巴吸入本品。
4. 哺乳期母犬使用本品后,避免幼犬与其在毛发干燥前接触。
5. 对氯己定、咪康唑过敏的人应避免接触本品。
6. 避免在治疗后立即过多接触和抚摸动物。
7. 皮肤癣菌病对人类具有传染性,建议用药时佩戴手套并遮盖手臂。

【休药期】 无需制定。

【规格】 250ml:硝酸咪康唑 5g+葡萄糖酸氯己定 5g

【包装】

【贮藏】 密封保存。

【有效期】 24个月;开启后3个月。

【生产企业】

(二)复方硝酸咪康唑洗剂标签

宠物用 外用

【兽药名称】

通用名称: 复方硝酸咪康唑洗剂

商品名称:

英文名称: Compound Miconazole Nitrate Shampoo

汉语拼音: Fufang Xiaosuan Mikangzuo Xiji

【主要成分】 硝酸咪康唑、葡萄糖酸氯己定

【性状】 本品为微黄色至黄色黏稠澄清液体。

【适应证】 用于治疗和控制犬由犬小孢子菌、厚皮马拉色菌和中间葡萄球菌引起的脂溢性皮炎。

【用法与用量】 外用: 每1kg体重, 犬1~2ml, 视被毛厚度而定。每周2次, 直到皮肤患处症状消退, 然后每周1次或根据病情控制需要使用。用干净的水彻底浸湿毛皮, 将本品涂在全身多处, 按摩至被毛和皮肤上并产生泡沫, 确保嘴唇周围、尾巴下方和脚趾之间能充分接触香波。静置10分钟, 然后用清水冲洗干净, 在温暖、通风环境中自然风干。

【规格】 250ml: 硝酸咪康唑 5g+葡萄糖酸氯己定 5g

【生产日期】

【生产批号】

【有效期】至

【休药期】 无需制定。

【贮藏】 密封保存。

【包装】

【生产企业】

十、金霉素预混剂说明书和标签

(一) 金霉素预混剂说明书

兽用处方药

【兽药名称】

通用名称: 金霉素预混剂

商品名称:

英文名称: Chlortetracycline Premix

汉语拼音: Jinmeisu Yuhunji

【主要成分】 金霉素

【性状】 本品为棕色或棕褐色粉末或颗粒, 无结块发霉, 无臭。

【药理作用】 金霉素属于四环素类广谱抗生素, 对葡萄球菌、溶血性链球菌、炭疽杆菌、破伤风梭菌和梭状芽孢杆菌等革兰氏阳性菌作用较强, 但不如 β -内酰胺类。对大肠埃希菌、沙门氏菌、布鲁氏菌和巴氏杆菌等革兰氏阴性菌较敏感, 但不如氨基糖苷类和酰胺醇类抗生素。本品对立克次体、衣原体、支原体、螺旋体、放线菌和某些原虫也有抑制作用。

【药物相互作用】 金霉素能与镁、钙、铝、铁、锌、锰等多价金属离子形成难溶性的络合物, 从而影响药物的吸收。因此, 它不宜与含上述多价金属离子的药物、饲料及乳制品共服。

【适应证】 用于治疗由敏感肠道致病性大肠埃希菌引起的40日龄左右绵羊羔羊腹泻; 治疗断奶仔猪腹泻; 治疗猪气喘病、增生性肠炎等。

【用法与用量】以金霉素计。混饲：拌入日采食量10%的开口料中，每1kg体重，40日龄左右绵羊羔羊25mg，一日1次，连用5日；每1000kg饲料，猪400~600g，连用7日。

【不良反应】按规定的用法与用量使用尚未见不良反应。

【注意事项】在猪丹毒疫苗接种前2日和接种后10日内，不得使用金霉素。

【休药期】羊10日，猪7日。

【规格】按金霉素计算(1)1000g:150g(1.5亿单位)(2)1000g:200g(2亿单位)

【包装】

【贮藏】遮光，密封，在干燥处保存。

【有效期】18个月

【批准文号】

【生产企业】

(二)金霉素预混剂标签

兽用处方药

【兽药名称】

通用名称：金霉素预混剂

商品名称：

英文名称：Chlortetracycline Premix

汉语拼音：Jinmeisu Yuhunji

【主要成分】金霉素

【性状】本品为棕色或棕褐色粉末或颗粒，无结块发霉，无臭。

【适应证】用于治疗由敏感肠道致病性大肠埃希菌引起的40日龄左右绵羊羔羊腹泻；治疗断奶仔猪腹泻；治疗猪气喘病、增生性肠炎等。

【用法与用量】以金霉素计。混饲：拌入日采食量10%的开口料中，每1kg体重，40日龄左右绵羊羔羊25mg，一日1次，连用5日；每1000kg饲料，猪400~600g，连用7日。

【规格】按金霉素计算(1)1000g:150g(1.5亿单位)(2)1000g:200g(2亿单位)

【批准文号】

【生产日期】

【生产批号】

【有效期】至

【休药期】羊10日，猪7日。

【包装】

【贮藏】遮光，密封，在干燥处保存。

【生产企业】

农业农村部办公厅关于2024年 第三期兽药质量监督抽检情况的通报

农办牧〔2024〕23号

各省、自治区、直辖市农业农村（农牧）、畜牧兽医厅（局、委），新疆生产建设兵团农业农村局：

为加强兽药质量监管，保障安全用药，根据《2024年兽药质量监督抽检和风险监测计划》安排，我部组织对兽药生产、经营和使用单位进行兽药质量监督抽检，同时对日常监管中发现存在风险隐患生产企业的相关兽药产品进行跟踪检验。现将2024年第二季度监督抽检有关情况通报如下。

一、总体情况

兽用生物制品省级监督抽检15批，不合格0批；兽用生物制品部级监督抽检87批，不合格1批（见附件1）；非生物制品类兽药产品省级监督抽检2927批，不合格21批（见附件2）；非生物制品类兽药产品部级跟踪检验451批，不合格25批（见附件3）；发现假兽药3批和不符合兽药追溯二维码监管要求的兽药产品2批（见附件4）。

兽药质量监督抽检结果相关信息请登录“中国兽药信息网”的“国家兽药产品基础数据查询系统”查阅。

二、不合格产品情况

（一）兽用生物制品部级监督抽检不合格情况

1.总体情况：共对48家标称生产企业的87批产品进行了检验，其中1家企业生产的1批产品不合格，不合格率为1.1%。

2.不合格项目：无菌检验。

（二）非生物制品类兽药产品省级监督抽检不合格情况

1.总体情况：共对656家标称生产企业的2927批产品进行了检验，其中20家企业生产的21批产品不合格，不合格率为0.7%。上述2927批产品，均未检出非法添加物。

2.不合格项目：主要包括性状、鉴别、检查、含量测定等项目。21批不合格产品中，12批产品1个项目检验不合格，8批产品2个项目检验不合格，1批产品3个项目检验不合格。

3.抽检环节：生产环节、经营环节和使用环节的抽检数量分别占抽检总数的17.1%、74.0%、8.9%，不合格率分别为0、0.9%、0.4%。

4.产品类别：化学药品类、抗生素类、中药类、其他类产品分别占抽检总数的40.0%、36.6%、20.7%、2.7%，不合格率分别为0.9%、0.6%、0.7%、1.3%。

(三) 非生物制品类兽药产品部级跟踪检验不合格情况

1. 总体情况: 共对118家标称生产企业的451批产品进行了跟踪检验, 其中15家企业生产的25批产品不合格, 不合格率为5.5%。除四川锦茂生物科技有限公司生产的1批卡巴匹林钙粉检出非法添加物外, 其余产品均未检出非法添加物。

2. 不合格项目: 1批产品鉴别项不合格, 17批产品检查项不合格, 5批产品含量测定项不合格, 1批产品鉴别项和含量测定项不合格, 1批产品检查项和含量测定项不合格。

3. 产品类别: 化学药品类、抗生素类、中药类、其他类产品分别占抽检总数的37.0%、38.6%、22.0%、2.4%, 不合格率分别为3.6%、4.6%、11.1%、0。

(四) 假兽药及不符合兽药追溯二维码监管要求兽药产品情况

发现假兽药3批, 无追溯信息的兽药产品2批。

三、重点监控企业情况

根据《2024年兽药质量监督抽检和风险监测计划》重点监控企业判定原则, 拟将下列企业判定为重点监控企业:

(一) 四川锦茂生物科技有限公司。当期兽药质量通报产品被检出添加其他药物成分。

(二) 陕西益佳尔生物药业有限公司。当期兽药质量通报产品含量低于50%。

(三) 安徽佰斯特生物科技有限公司。当期兽药质量通报产品含量低于50%、全年兽药质量通报中同一企业被抽检产品不合格累计3批。

(四) 江西创导动物保健品有限公司。全年兽药质量通报中同一企业被抽检产品不合格累计3批。

(五) 江西嘉美生物药业有限公司。全年兽药质量通报中同一企业被抽检产品不合格累计7批。

(六) 四川永久畜牧药业有限公司。从经营环节抽取的有效成分含量为0的产品, 经核实为企业生产。

四、有关工作要求

对抽检发现的假劣兽药, 各地要按照《兽药质量监督抽查检验管理办法》和《2024年兽药质量监督抽检和风险监测计划》要求, 及时做好追踪溯源, 依法严肃查处违法违规行为。

经营、使用环节抽取的样品经检验判定为不合格的, 仅代表被抽样单位在被抽样时销售或使用的兽药产品存在质量问题, 通常不能直接证明标称生产企业生产的同批兽药产品或其他兽药经营企业销售的同批兽药产品也存在质量问题。标称生产企业所在地省级畜牧兽医主管部门应按照《兽药质量监督抽查检验管理办法》要求, 组织开展调查核实, 对确系标称生产企业责任导致产品不合格的, 要及时立案查处; 经核实不属于标称生产企业责任导致产品不合格的, 要将调查核实情况通报被抽样单位所在地省级畜牧兽医主管部门, 由被抽样单位所在地省级畜牧兽医主管部门综合相关情况依法组织查处。

案件查处完成后, 省级畜牧兽医主管部门要及时将相关执法办案情况报我部畜牧兽医局和法规司, 并组织有关单位依法公开案件查处信息; 对符合撤销兽药产品批准文号条件的, 要及时将撤销兽药产品

批准文号建议报我部畜牧兽医局。

联系人及电话: 农业农村部畜牧兽医局 王子东
010—59193267

- 附件: 1. 2024年第二季度部级监督抽检不合格兽用生物制品汇总表
2. 2024年第二季度省级监督抽检不合格非生物制品类兽药产品汇总表
3. 2024年第二季度部级跟踪检验不合格非生物制品类兽药产品汇总表
4. 假兽药及不符合兽药追溯二维码监管要求情况汇总表

农业农村部办公厅
2024年9月19日

附件1

2024年第二季度部级监督抽检不合格兽用生物制品汇总表

序号	抽检环节	产品名称	标称生产企业	被抽样单位名称	生产批号	不合格项目	检验单位(简称)	备注
1	生产环节	鸭瘟活疫苗	山东华宏生物工程有限公司	山东华宏生物工程有限公司	202304003	无菌检验	中监所	“中监所”为中国兽药药品监察所简称。

附件2

2024年第二季度省级监督抽检不合格非生物制品类
兽药产品汇总表

序号	抽检环节	产品名称	标称生产企业	被抽样单位名称	生产批号	不合格项目	检验单位(简称)	备注
1	经营环节	伊维菌素注射液	张家口万全区科泰生物科技有限公司	新疆蓝鸽商贸有限公司	230221	性状(淡黄色的澄明液体)、含量测定(含量为标示量的51.5%)	新疆所	“新疆所”为新疆维吾尔自治区兽药饲料监察所简称。其他检验单位也均为相关检验机构简称。

续表

序号	抽检环节	产品名称	标称生产企业	被抽样单位名称	生产批号	不合格项目	检验单位(简称)	备注
2	经营环节	苦参末	山西省鱼虾安水产药业有限公司	连云港市赣榆区惠丰鱼病防控服务部	20230701	含量测定(苦参碱和氧化苦参碱总量为6.9mg/g, 限度为不得少于12.0mg/g)	江苏所	
3	经营环节	板蓝根注射液	芮城县同仁兽药有限公司	剑川县诚惠兽药经营服务部	230202	含量测定[(R,S)-告依春含量为0.0077mg/ml, 限度为不得少于0.010mg/ml]	云南所	
4	经营环节	复合碘溶液(水产用)	山西众玖生物科技有限公司	湖州南浔盛建英渔需品经营部	20240307	检查(分配系数为63, 限度为不得低于130)、含量测定[磷酸含量无法测定; 活性碘含量为0.6%(g/g), 限度为1.8%~2.0%(g/g)]	浙江所	
5	使用环节	聚维酮碘溶液(水产用)	山西众玖生物科技有限公司	吴廷晓虾塘	20230603	含量测定(含量为标示量的3.2%, 限度为8.5%~12.0%)	广西所	
6	经营环节	复合碘溶液(水产用)	山西惠川生物科技有限公司	泗洪县杨氏渔药经营部	20240301	含量测定(磷酸含量无法测定)	江苏所	
7	经营环节	乙酰甲嗪注射液	山西省芮城县红宝兽药有限责任公司	铜川市耀州区畜牧大发饲料经营部	2023081701	检查(可见异物不符合规定)	陕西中心	
8	经营环节	聚维酮碘溶液(水产用)	山西金宏达药业有限公司	钟楼区郇区建春鱼药商店	20240201	检查(pH值为1.9, 限度为3.0~6.5)、含量测定(含量为标示量的5.0%, 限度为8.5%~12.0%)	江苏所	
9	经营环节	大黄碳酸氢钠片	德州京信药业有限公司	富锦于才兽药店	20230507	检查(重量差异不合格)	黑龙江站	
10	经营环节	右旋糖酐铁注射液	山东富利特药业有限公司	恩施州志兴生物科技有限公司	20221104	含量测定(含铁为标示量的91.8%)	湖北所	
11	经营环节	乙酰甲嗪注射液	河南百草元兽药有限公司	浏阳太平桥中一农牧兽药店	2023050902	含量测定(含量为标示量的76.1%)	湖南所	
12	经营环节	银黄注射液	河南华伦科技有限公司	济源市邵原镇亚卫兽药经营部	20240201	鉴别(未检出绿原酸)、含量测定(黄芩苷含量为2.3mg/ml, 限度为不得少于6.0mg/ml)	河南院	
13	经营环节	伊维菌素注射液	长沙金方堂生物科技有限公司	银川市西夏区文斌兽药店	20231002	含量测定(含量为标示量的81.1%)	宁夏所	
14	经营环节	氟苯尼考注射液	四川华蜀动物药业有限公司	武平县老毛兽药店	20230901	性状(为微黄色的乳油液)、检查(可见异物不符合规定)、含量测定(含量为标示量的87.1%)	福建所	

续表

序号	抽检环节	产品名称	标称生产企业	被抽样单位名称	生产批号	不合格项目	检验单位(简称)	备注
15	经营环节	阿莫西林可溶性粉	四川永久畜牧药业有限公司	德保县农家之友兽药饲料经营部	20240101	鉴别(无主峰)、含量测定(含量为0)	广西所	
16	经营环节	伊维菌素溶液	四川显华动物药业有限公司	陇川县章凤利农兽药经营部	20230303	检查(水分为2.3%,限度为不得过1.0%)、含量测定(含量为标示量的84.1%)	云南所	
17	经营环节	聚维酮碘溶液	自贡市天翔动物药业有限公司	陇川县章凤黄红兽药经营部	231002	含量测定(含量为标示量的5.0%,限度为8.5%~12.0%)	云南所	
18	经营环节	替米考星注射液	四川坤旺生物科技有限公司	重庆市潼南区同安牧业服务部	20230301	鉴别(供试品峰与对照品峰保留时间不一致)、含量测定(含量无法测定)	重庆所	
19	经营环节	恩诺沙星注射液	四川锦善和生物科技有限公司	兴义市王万会兽药经营部	230203	含量测定(含量为标示量的86.1%)	贵州所	
20	经营环节	安乃近注射液	四川鼎尖动物药业有限责任公司	南阳市神达畜牧有限公司	20231101	检查(可见异物不符合规定)	河南院	
21	经营环节	阿苯达唑伊维菌素片	重庆美邦农生物技术有限公司	新疆邦杰雅致农牧业有限公司轮台县康诺分公司	20231001	性状(为蓝色片)、含量测定(含量为标示量的22.9%)	新疆所	

附件3

2024年第二季度部级跟踪检验不合格非生物制品类 兽药产品汇总表

序号	抽检环节	产品名称	标称生产企业	被抽样单位名称	生产批号	不合格项目	检验单位(简称)	备注
1	生产环节	伊维菌素注射液	辽宁天鹏生物科技股份有限公司	辽宁天鹏生物科技股份有限公司	20240228	检查(可见异物不符合规定)	中监所	“中监所”为中国兽医药品监察所简称。其他检验单位也均为相关检验机构简称。
2	生产环节	盐酸赛拉嗪注射液	敦化市圣达动物药品有限公司	敦化市圣达动物药品有限公司	20240305	检查(可见异物不符合规定)	河南院	

续表

序号	抽检环节	产品名称	标称生产企业	被抽样单位名称	生产批号	不合格项目	检验单位(简称)	备注
3	生产环节	清胃散	通化兽药厂	通化兽药厂	240401	鉴别(鉴别1未检出知母的显微特征)	山西所	
4	生产环节	双丁注射液	哈尔滨三马药业有限公司	哈尔滨三马药业有限公司	20240202	检查(可见异物不符合规定)	中监所	
5	生产环节	硫酸黏菌素可溶性粉	江苏南京农大动物药业有限公司盱眙分公司	江苏南京农大动物药业有限公司盱眙分公司	20240318	含量测定(含量为标示量的146.0%)	辽宁中心	
6	生产环节	复方磺胺间甲氧嘧啶钠粉	安徽佰斯特生物科技有限公司	安徽佰斯特生物科技有限公司	2024032103	含量测定(甲氧苄啶含量为标示量的20.5%)	河南院	
7	生产环节	氟苯尼考粉	安徽佰斯特生物科技有限公司	安徽佰斯特生物科技有限公司	2024040101	含量测定(含量为标示量的79.3%)	河南院	
8	生产环节	盐酸多西环素可溶性粉	安徽佰斯特生物科技有限公司	安徽佰斯特生物科技有限公司	2024032201	含量测定(含量为标示量的81.5%)	河南院	
9	生产环节	盐酸林可霉素注射液	江西创导动物保健品有限公司	江西创导动物保健品有限公司	20230701	检查(可见异物不符合规定)	中监所	
10	生产环节	鱼腥草注射液	江西创导动物保健品有限公司	江西创导动物保健品有限公司	20240102	检查(可见异物不符合规定)	中监所	
11	生产环节	穿心莲注射液	江西创导动物保健品有限公司	江西创导动物保健品有限公司	20230901	检查(可见异物不符合规定)	中监所	
12	生产环节	鱼金注射液	江西嘉美生物药业有限公司	江西嘉美生物药业有限公司	20240101	检查(可见异物不符合规定)	中监所	
13	生产环节	板蓝根注射液	江西嘉美生物药业有限公司	江西嘉美生物药业有限公司	20231202	检查(可见异物不符合规定)	中监所	
14	生产环节	鱼腥草注射液	江西嘉美生物药业有限公司	江西嘉美生物药业有限公司	20230602	检查(可见异物不符合规定)	中监所	
15	生产环节	黄芪多糖注射液	江西嘉美生物药业有限公司	江西嘉美生物药业有限公司	20240101	检查(可见异物不符合规定)	中监所	
16	生产环节	双黄连注射液	江西嘉美生物药业有限公司	江西嘉美生物药业有限公司	20220701	检查(可见异物不符合规定)	中监所	
17	生产环节	鱼腥草注射液	江西嘉美生物药业有限公司	江西嘉美生物药业有限公司	20230502	检查(可见异物不符合规定)	中监所	
18	生产环节	复合维生素B注射液	江西嘉美生物药业有限公司	江西嘉美生物药业有限公司	20240102	检查(可见异物不符合规定)	中监所	
19	生产环节	伊维菌素注射液	河南佰依生物制药有限公司	河南佰依生物制药有限公司	20240202	检查(可见异物不符合规定)	中监所	
20	生产环节	双黄连注射液	中兽医(汤阴)生物科技有限公司	中兽医(汤阴)生物科技有限公司	20240101	检查(可见异物不符合规定)	中监所	
21	生产环节	卡巴匹林钙粉	湖南博伦生物科技有限公司	湖南博伦生物科技有限公司	24032901	含量测定(含量为标示量的83.3%)	河南院	

序号	抽检环节	产品名称	标称生产企业	被抽样单位名称	生产批号	不合格项目	检验单位(简称)	备注
22	生产环节	磺胺间甲氧嘧啶钠注射液	四川金瑞克动物药业有限公司	四川金瑞克动物药业有限公司	20240116	检查(可见异物不符合规定)	河南院	
23	生产环节	盐酸土霉素可溶性粉	四川佳华动物药业有限公司	四川佳华动物药业有限公司	20240301	检查(干燥失重为8.7%)、含量测定(含量为标示量的125.5%)	辽宁中心	
24	生产环节	卡巴匹林钙粉	四川锦茂生物科技有限公司	四川锦茂生物科技有限公司	20240401	检查(检出非处方阿莫西林)	河南院	
25	生产环节	氟苯尼考粉	陕西益佳尔生物药业有限公司	陕西益佳尔生物药业有限公司	20240401	鉴别(无主峰)、含量测定(含量为0)	辽宁中心	

附件4

假兽药及不符合兽药追溯二维码监管要求情况汇总表

序号	抽检环节	产品名称	标称生产企业	产品批准文号	生产批号	被抽样单位	备注
一、假兽药							
1	经营环节	黄连解毒片	广西天威动物药业有限公司	兽药字200635177	2024	平和县曾志生兽药店	假企业
2	经营环节	安乃近注射液	哈尔滨市锐安动物药业有限公司	兽药字220114754	20230105	西安神龙兽药有限公司	假企业
3	经营环节	恩诺沙星溶液	贵州奔驰动物药业有限责任公司	兽药字240012520	20230508	泗水县金庄镇元龙畜牧服务中心	假企业
二、不符合兽药追溯二维码监管要求兽药产品							
1	经营环节	磺胺氯吡嗪钠可溶性粉	上海明磊邦森生物科技(登封)有限公司	兽药字163481628	20230801	江津区益源兽药经营部	无追溯信息
2	经营环节	替米考星注射液	四川坤旺生物科技有限公司	兽药字221242192	20230301	重庆市潼南区同安牧业服务部	无追溯信息